

BIOFERMIN® 氧化镁便秘药

- ◆无刺激性成分，不易引起腹痛
由于氧化镁成分不直接刺激肠道，因此即使反复服用也不易引起腹痛，不会产生依赖性。
- ◆帮助实现接近自然的排便
氧化镁可集中水分于肠内，使硬便适当柔软，令排便顺利通畅。
- ◆乳酸菌对便秘有效
乳酸菌通过调节肠道环境改善便秘。

效能

- 便秘
- 缓解便秘所伴随的以下症状：皮肤粗糙、粉刺、头重、上火、食欲不振（食欲减退）、痔疮、肠内异常发酵、腹胀

用法及用量

请在入睡前（或空腹时）按以下用量、1天1次、配合水或温开水服用。但是，初次时请使用最小量，然后根据排便情况及状态，逐步增量或减量。

- 15岁以上，1次3~6片，1天1次
- 11岁~14岁，1次2~4片，1天1次
- 7岁~10岁，1次2~3片，1天1次
- 5岁~6岁，1次1~2片，1天1次
- 未满5岁，不宜服用

用法及用量相关注意

- 请严格遵守用法和用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 为了防止发生噎住，请勿让未满5岁的婴幼儿服用。

成分

6片中（15岁以上1天最大服用量）中

氧化镁 2,000mg

乳酶生（乳酸菌） 20mg

添加剂

纤维素，交联羧甲基纤维素钠，硬脂酸钙

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 在服用本药剂期间，不要服用下述医药品
其他泻下药（泻药）

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
老年人。
拥有以下症状的人群。
剧烈腹痛，恶心、呕吐
接受以下诊断的人群。
肾脏病
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带药品说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
消化系统：剧烈腹痛，恶心、呕吐
精神神经系统：睡意强烈，意识模糊
循环系统：起立眩晕，脉搏变慢
呼吸系统：气闷
其他：肌力下降，口腔干燥
- 服用后可能会出现下述症状，若此类症状持续或加重时，请停止服用，并携带药品说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

腹泻

- 若服用 1 周左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带药品说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)
- 打开盖子后请将瓶内的填充物扔掉。
(此填充物是为了防止药剂在运输过程中发生破损。如果将填充物再次放进瓶子中的话，可能会吸湿，从而导致药品变质或混入异物。)
- 药瓶中放有干燥剂。请勿服用。
- 服用后务必盖好瓶盖。
(会发生其他味道移味、吸湿而发生变质。)
- 请勿服用超过使用期限的产品。
- 在盒子和瓶子的“开封年月日”标注栏中记下开瓶日期。
- 一旦开封后，为了保证质量，请尽量在开封日开始 6 个月以内，迅速服用。

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。