

从小肠到大肠广范围有效的4种乳酸菌可抑制有害菌的繁殖,整合紊乱的肠道菌群,改善腹部症状(软便,便秘,腹胀)。

效能或效果

肠胃治理(改善排便),软便,便秘,腹胀

用法及用量

请餐后服用以下量

15岁以上,1次3片,1天3次

5岁~14岁,1次2片,1天3次

未满5岁,不宜使用

用法及用量相关注意

儿童服用时应在监护人指导监督下服用。

请严格遵守规定的用法用量。

为了防止发生噎住,请勿让未满5岁的婴幼儿服用

成分及分量

9片中(15岁以上1天服用量)中

Bifidobacterium: Bifidobacterium bifidum 9 mg, Bifidobacterium longum 9 mg

Lactomin: Streptococcus faecalis 18 mg, Lactobacillus acidophilus 18 mg

添加剂

Corn Starch, Dextrin, Lactose, Precipitated Calcium Carbonate, Maltose Syrup Powder, White Soft Sugar, Talc, Magnesium Stearate, Fructo oligosaccharide

使用注意事项

咨询事项

- 下述人群请在服用前咨询医生或药剂师
正在接受医师治疗的人群
- 出现下述症状时,请立即停止服用,并携带附件书咨询医生或药剂师
即使服用1个月左右,症状仍不见好转的情况

保管及使用注意事项

请保管在儿童无法触及的地方。

请勿服用超过使用期限的产品。

保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。

打开盖子后请将瓶内的填充物扔掉。(如果将填充物再次放进瓶子中的话因为含有湿气会导致变质。填充物是为了防止药剂在运输过程中发生破损。)

服用后务必盖好瓶盖。(会发生其他味道移味,吸湿而发生变质。)

请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)

在盒子和瓶子的“开封年月日”标注栏中记下开瓶日期

一旦开封后,为了保证质量,请尽量在开封日开始6个月以内,迅速服用

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的,基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品(或准药物)

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的,仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方(或本公司)临时翻译而成,未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题,提供方(或本公司)概不承担任何责任