

SHIN BIOFERMIN® S PLUS TABLETS

지정 의약 부외품

정장약

소장에서 대장까지 넓게 작용하는 4가지 종류의 유산균이, 유해균의 증식을 억제하고, 흐트러진 장내플로라를 정돈, 배 증상(난변, 변비, 복부 팽만감)을 개선해줍니다.

효능 또는 효과

정장(배변 조절), 연변, 변비, 복부 팽만감

용법 및 용량

다음의 양을 식후에 복용하십시오.

15세 이상, 1회 3정, 1일 3회

5세~14세, 1회 2정, 1일 3회

5세 미만, 복용하지 말 것

용법 및 용량에 관한 주의

소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 복용시킬 것.

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

목에 걸리면 안되므로, 5세 미만의 유아에게는 복용시키지 마십시오.

성분 및 분량

9정(15세 이상의 1일 복용량) 중

Bifidobacterium: Bifidobacterium bifidum 9 mg, Bifidobacterium longum 9 mg

Lactomin: Streptococcus faecalis 18 mg, Lactobacillus acidophilus 18 mg

첨가물

Corn Starch, Dextrin, Lactose, Precipitated Calcium Carbonate, Maltose Syrup Powder, White Soft Sugar, Talc, Magnesium Stearate, Fructo oligosaccharide

사용상의 주의

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사 또는 약사에게 상담하십시오.
의사의 치료를 받고 있는 사람.
- 다음의 경우는 즉시 사용을 중단하고, 첨부문서를 지참하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
1개월 정도 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우

보관 및 취급상의 주의

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.

병 안의 패키지는 뚜껑을 개봉한 후 버릴 것.(패키지를 다시 병에 넣을 경우 습기를 포함해 품질이 변하는 원인이 될 수 있다. 패키지는 수송 중에 정제가 파손되는 것을 방지하기 위한 것이다.)

복용 시마다 병 뚜껑을 확실히 닫을 것. (다른 냄새가 옮겨지거나 흡습하여 품질이 변한다.)

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

상자와 병의 '개봉년월일' 기입란에 병을 개봉한 날짜를 기입할 것.

한 번 개봉한 후에는 품질유지 차원에서 개봉일로부터 6개월 이내를 기준으로 가급적 빨리 복용할 것.

11

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품.(또는 의약 부외품)입니다
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..