

●配合了乳酸菌,維生素C,B2和B6●改善腸內環境,調節排便。在大腸中起作用的雙歧桿菌和在小腸中起作用的乳酸菌,能調節腸內環境,對便秘和腹脹(腹部膨脹感)有效。●大小容易服用的檸檬色錠劑

療效或效果

整腸(通便),便秘,腹部膨脹感,軟便

用法及用量

請於餐後用冷水或微溫水服用以下用量：

15歲以上, 1天3次, 1次2片

未滿15歲者, 請勿服用

用法及用量相關的注意事項

請務必遵守規定用法,用量。

成分及分量

6片中(15歲以上的每日服用量)中

Bifidobacterium 18mg

Lactomin 18mg

Vitamin C (Ascorbic acid) 500mg

Vitamin B2 (Riboflavin) 6mg

Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 12mg

添加劑

Corn starch, Reduced maltose syrup, Carboxymethylcellulose calcium, Erythritol, Magnesium stearate, Aspartame (L-phenylalanine compound), Silicon dioxide

成分相關的注意事項

接受尿液或糞便檢查時, 請告知醫師現正服用本藥物。(可能影響尿液或糞便檢查數值)

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色, 此為本藥劑所含維生素B2 (Riboflavin)的影響, 無須擔憂

成分中的維生素B2 (Riboflavin)可能造成部分錠劑出現紅色斑點, 但藥效不變。

使用上的注意事項

諮詢事項

●下列的人於服用前, 請諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

接受過下列診斷的人。

苯酮尿症

●服用後, 出現下列症狀的情況下, 有可能是副作用, 請立刻停止服用, 攜帶附件, 諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者

消化器官: 噁心,嘔吐

●服用後, 可能出現下列症狀, 這種症狀持續或變嚴重的情況下, 請停止服用, 攜帶附件, 諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者

腹瀉

●即使服用1個月左右, 症狀也沒有改善的情況下, 請停止服用, 攜帶附件, 諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到 濕氣少的陰涼處蓋緊。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)

開瓶後請將瓶中填充物丟棄。(將填充物再次放入瓶中可能因所吸收的濕氣而造成錠劑變質。填充物為防止運送過程錠劑破損之用。)

每次服用後請旋緊瓶蓋。(避免吸收其他氣味或濕氣而造成變質。)

請勿服用超過使用期限的產品。

請於外盒及外瓶「開封年月日」填寫欄內填入開瓶日期。

基於品質考量, 一旦開封, 請於開封日起6個月內儘速服用完畢

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品（或準藥物）。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。