

◆ Colac Mg是含有非刺激成分的氧化镁的便秘药。■氧化镁会在肠内聚集水分，使大便变得柔软，对于大便容易干燥的人群也有效果。

效能或效果

1)便秘□缓解便秘所伴随的以下症状：头重、上火、皮肤粗糙、粉刺、食欲不振（食欲减退）、腹胀、肠内异常发酵、痔疮□

用法及用量

在入睡前（或空腹时），请按以下用量并配合水或温开水服用。但是，初次时用最少量，根据大便通畅的情况，一点一点地增量或减量。

15岁以上，1天1次，1次3~6片

11岁~14岁，1天1次，1次2~4粒

7岁~10岁，1天1次，1次2~3粒

5~6岁，1天1次，1次1~2片

未满5岁，不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

药片的取用方法

·如图所示用指尖用力按下装有药片的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。

·（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

成分及分量

6片中

氧化镁

1980mg

添加剂

纤维素

交联羧甲基纤维素钠

硬脂酸钙

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

●在服用本药剂期间，不要服用下述医药品

其他泻下药（泻药）

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

老年人。

拥有以下症状的人群

剧烈腹痛

恶心、呕吐

接受以下诊断的人群

肾脏病

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

消化系统：

剧烈腹痛

恶心、呕吐

精神神经系统：

睡意强烈

意识模糊

循环系统：

起立眩晕

脉搏变慢

呼吸系统：

气闷

其他：

肌力下降

口腔干燥

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

腹泻

●若服用1周左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。(为了保证质量)

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任