

복용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

대황감초탕 제제

TAISHO KAMPO LAXATIVES

판매명: TAISHO KAMPO LAXATIVES **제2류 의약품(일반의약품)** <변비약>

- ◆ TAISHO KAMPO LAXATIVES은 변비나 변비에 동반되는 뻘루지·피부염·복부 팽만을 개선하는 한방 처방 '대황감초탕' 변비약입니다.
- ◆ 취침 전에 복용하면 다음 날 아침 정상에 가까운 배변이 가능합니다.
- ◆ 자르는 선이 표시되어 있고 크기가 작아 복용하기 쉬운 정제입니다.



사용상의 주의사항



금지 사항



(준수하지 않을 시에는 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생할 우려가 있습니다)

- 1 본 약제를 복용하는 동안에는 다음 의약품을 복용하지 마십시오
기타 완하제(하제)
- 2 모유 수유 중인 사람은 본 약제를 복용하지 않거나 복용할 경우에는 수유를 피하십시오.



상담 필요



- 1 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.
 - (1)의사에게 치료를 받고 있는 사람.
 - (2)임신 또는 임신 중이라고 생각되는 사람.
 - (3)몸이 허약한 사람(체력이 약한 사람, 몸이 약한 사람).
 - (4)위장이 약하고 쉽게 설사하는 사람.
 - (5)약물 등으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
 - (6)다음과 같은 증상이 있는 사람.
극심한 복통, 메스꺼움, 구토
- 2 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.
- 3 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해질 경우 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.
설사
- 4 5~6일 동안 복용해도 증상이 좋아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
소화기	극심한 복통을 동반한 설사, 메스꺼움, 구토, 복통

성분

4정 중

대황감초탕 추출물(2/5 분량)	400mg				
<table border="1"> <tr> <td>대황</td> <td>1600mg</td> </tr> <tr> <td>감초</td> <td>400mg</td> </tr> </table>	대황	1600mg	감초	400mg	
대황	1600mg				
감초	400mg				

대황과 감초의 유효 성분을 추출한 추출물이 대장의 활동을 조절하여 정상적으로 배변할 수 있게 도와 줍니다.

[주의]

- (1) 본 약제를 복용하면 소변이 주황색이나 적색으로 변할 수 있지만 이것은 본 약제 중 대황에 의한 것이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.
- (2) 본 약제는 생약을 이용한 제제이므로 제품에 따라 색이 다소 다를 수 있지만 효과는 동일합니다.

첨가물: 마그네슘 알루미노메타실리케이트, 무수규산, 감자 전분, 카르복시메틸셀룰로스 칼슘, 하이드록시프로필 셀룰로스, 스테아르산 마그네슘, 경화유





효능

변비, 변비로 인해 머리가 무거워짐, 머리로 피가 몰림, 습진, 피부염, 뽀루지(여드름), 식욕 부진(식욕 감퇴), 복부 팽만, 장내 이상 발효, 치질 등의 증상 완화

[주의] 체력에 상관없이 사용할 수 있습니다.

용법·용량

다음 용량을 취침 전에 씹지 말고 물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.
단, 처음에는 최소한의 용량을 복용하고 용변 상태를 보면서 반 정 또는 1정씩 늘리거나(아래에 표시된 최대 수량까지) 줄이십시오.

연령	1회 용량		복용 횟수
	2~3일 동안 용변을 보지 못할 때	4일 이상 용변을 보지 못할 때	
성인 (15세 이상)	1정~3정 	2정~4정 	1일 1회
어린이 (5-14세)	반 정~1정 	1정~2정 	
5세 미만	복용하지 마십시오		

[주의]

- 정해진 용법·용량을 엄격하게 준수하십시오.
- 어린이가 복용하는 경우 보호자의 지도 감독 하에 복용해야 합니다.
- 월경 시에는 복용량을 줄이십시오.
- 젖은 손으로 만진 정제는 다시 병에 넣지 마십시오.
(변색의 원인이 되며 품질 유지가 곤란할 수 있습니다.)

처음 복용할 때

- 병 입구 스티커를 떼어내 버리십시오.
- 충전재를 꺼내 버리십시오.
(이 충전재는 운송 중 정제의 파손을 방지하기 위한 것입니다. 병에 넣었다 뺐다 하면 이물질이 들어갈 수 있습니다.)



보관 및 취급상의 주의사항

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 장소에 뚜껑을 완전히 닫아 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 바꿔 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오. 사용기한이 지나지 않았어도 개봉 후에는 6개월 이내에 복용하십시오. (품질 유지를 위해)



변비 해소 포인트

<먼저 생활 습관부터 다시 살펴 봅니다>

- 규칙적인 배변 습관
하루 한 번 정해진 시간(아침 식사 후가 가장 적합)에 화장실에 갑니다. 용변 신호가 오면 참지 않는 것이 중요합니다.
- 식생활 개선
하루 세 번 규칙적인 식생활과 식이섬유가 많이 함유된 식품(채소류, 콩류, 고구마·감자류, 해조류 등)을 매일 섭취하고 수분을 충분히 섭취하는 것도 중요합니다.
- 적절한 운동
운동 부족은 변비의 큰 적입니다. 적절한 운동을 통해 복근을 단련하거나 복부 마사지를 하는 것도 중요합니다.



【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.