

TAISHO KAMPO LAXATIVES

- ◆TAISHO KAMPO LAXATIVES 為改善便秘及伴隨便秘而來的粉刺、皮膚炎、小腹凸出（腹部膨脹）等症狀，以漢方配方「大黃甘草湯」所研製而成的便秘藥。
- ◆就寢前服用，隔日早晨即可近乎自然地排便。
- ◆設有分割線，易於服用的小粒錠劑。

療效

舒緩便秘、伴隨便秘而出現的頭重、上火、濕疹、皮膚炎、粉刺（面皰）、食慾不振（食慾減少）、腹部膨脹、腸內異常發酵、痔瘡等症狀

注意事項

不需考慮體力狀況亦可使用。

用法及用量

請於睡前將以下用量不咬碎用冷水或微溫水吞服。

不過，請於首次使用最少用量，然後視排便情況或狀態，再逐漸半片乃至 1 片的增量（直至下列的最多用量為止）或減量。

成人（15 歲以上），2~3 天沒有排便時：1 次 1 錠~3 錠，1 天 1 次

成人（15 歲以上），4 天以上沒有排便時：1 次 2 錠~4 錠，1 天 1 次

兒童（5~14 歲），2~3 天沒有排便時：1 次半錠~1 錠半，1 天 1 次

兒童（5~14 歲），4 天以上沒有排便時：1 次 1 錠~2 錠，1 天 1 次

未滿 5 歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 生理期的女性請減量服用。
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色等影響品質）

成分

4 片中

大黃甘草湯萃取粉末（2/5 份量） 400mg
（大黃 1600mg，甘草 400mg）

添加劑

矽酸鋁鎂，二氧化矽，馬鈴薯澱粉，羧甲基纖維素鈣，羧丙基纖維素，硬脂酸鎂，硬化油

注意事項

- 因服用本藥劑而可能使尿液呈橙色至紅色，此為本藥劑所含大黃的影響，無須擔憂。
- 本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但藥效不變。

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品
其他瀉下藥（瀉藥）
- 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
身體虛弱的人（體力衰弱的人、體弱的人）。
胃腸弱，容易腹瀉的人。
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
有下列症狀的人。
劇烈腹痛，噁心、嘔吐
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：發疹、發紅，發癢

消化器官：伴隨劇烈腹痛的腹瀉，噁心、嘔吐，腹痛

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者腹瀉
- 即使服用 5~6 天左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請蓋緊瓶蓋並保管於避免陽光直射，濕氣較少的陰涼處。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。(為確保品質)

21

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。