

COLAC SUPPOSITORY TYPE

第三類醫藥品
便秘藥

◆COLAC栓劑所含細微球狀碳酸氣泡對直腸直接作用，促進順暢排便。■使用後約10~30分鐘可見效果。■適合12歲以上使用。

療效或效果

便秘

用法及用量

12歲以上，1次1粒插入直腸內，如果仍未有效果，請再插入多1粒。未滿12歲者請勿使用。(本藥劑是由肛門插入的藥劑。請勿口服。)
請務必遵守規定用法、用量。

使用本藥劑後，請稍微忍耐直至便意增強為止。

(使用後，若是馬上試著排便，可能僅排出藥劑而不見效果)

12歲以上兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。

如本藥劑過軟時，請將其暫時冷卻後再行使用。

此外，藥劑過硬時則暫時置於室溫下，待其軟化後再行使用。

本藥劑僅供肛門部位使用。

成分及分量

1粒(2.6g)中

Sodium bicarbonate 0.5g

Sodium Dihydrogen Phosphate 0.68 g 0.68g

添加劑

anhydrous silicic acid ,Soya lecithin,Hard fat

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

●下列的人請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

●服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他便秘藥(瀉藥,浣腸劑)

●請勿連續使用(若是常用，效果會減弱(產生所謂的「習慣」)，而且變得容易依賴藥劑。)

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

有劇烈腹痛或噁心·嘔吐的人。

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

消化器官：

腹瀉

有殘便感

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

休克：使用後立即感到胸悶等，同時出現臉色蒼白、四肢冰冷、冒冷汗、呼吸困難等症狀

●即使使用2~3次，也沒有便排的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

使用後可能出現下列症狀

肛門部位的刺激感

腹部不適感

腹痛

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低且溫度30℃以下的陰涼處保管

而鋁箔袋開封後未使用部分，請置於避免日光直射且濕度較低的陰涼處(15℃以下)保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

保管之際，請將塞劑前端朝下收入鋁箔袋後外盒後遵照外盒箭頭指示直立保管

請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。(為確保品質)

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。