

2024年8月

大正製薬株式会社

スルファメトキサゾールナトリウム又はスルファメトキサゾール含有製剤  
(眼科用薬・一般用医薬品)  
使用上の注意改訂のお知らせ

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、令和6年8月27日付け医薬安発0827第1号厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知『「使用上の注意」の改訂について』に基づき、本品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、本品の適正使用をお願い申し上げます。

なお、改訂内容を反映した製品の切替えまでには、しばらく時間がかかりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

記

スルファメトキサゾールナトリウム又はスルファメトキサゾール含有製剤（眼科用薬・一般用医薬品）

- ・抗菌アイリス使いきり
  - ・抗菌アイリス\*
  - ・新サルファグリチルアイリス\*\*
- \* 製造販売元：ファーマパック（株）  
\*\* 製造販売元：テイカ製薬（株）

<改訂内容>

改訂前	改訂後（____：改訂箇所）				
「してはいけないこと」 長期連用しないでください	「してはいけないこと」 1. <u>次の人は使用しないでください</u> <u>本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</u> 2. <u>長期連用しないでください</u>				
「相談すること」 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ..... (新設)	「相談すること」 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ..... <u>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。</u> <u>その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</u>				
	<table border="1"><thead><tr><th>症状の名称</th><th>症状</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>ショック</u> <u>(アナフィラキシー)</u></td><td><u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u></td></tr></tbody></table>	症状の名称	症状	<u>ショック</u> <u>(アナフィラキシー)</u>	<u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u>
症状の名称	症状				
<u>ショック</u> <u>(アナフィラキシー)</u>	<u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u>				

以上