

ANTIMICROBIAL IRIS DISPOSABLE

第二類醫藥品
抗菌眼藥水

◆抗菌愛力舒點眼液單劑量包裝四種有效成分有效作用，抑制引起麥粒腫、結膜炎的病菌繁殖，緩解眼睛發癢等炎症並改善因發炎而受損的眼睛狀態。◀獨家技術的製劑設計，藥液長時間停留眼睛表面。

療效或效果

結膜炎（流行性結膜炎）、針眼、眼瞼炎（眼瞼潰爛）、眼睛癢

用法及用量

請1天3~6次，1次2~3滴 滴眼。

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。

請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。

僅供點眼使用。

請勿用力拉扯開封。此外，開封時用力過度可能造成藥液噴濺，敬請留意。

本藥劑為「單次使用」的點眼劑，不含防腐劑，未用盡的殘餘藥液請廢棄。

※本藥劑屬於長效劑型，點眼後可能出現暫時性的視力模糊症狀，敬請注意

成分及分量

Sulfamethoxazole 4.00%

Dipotassium Glycyrrhizinate 0.25%

ε-Aminocaproic acid 1.00%

Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 0.10%

添加劑

Gellan gum, Tromethamine, Sodium citrate, Edetate sodium

成分及分量相關的注意事項

本藥劑點眼後，口中可能感到苦味或甜味，苦味為有效成分的sulfamethoxazole而甜味為有效成分的dipotassium glycyrrhizinate所造成，無須擔憂。

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

- 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

劇烈的眼睛痛

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

眼睛：

充血

發癢

腫脹

- 即使使用3~4天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿與他人共用

本藥劑為避免光線造成藥液變質而使用有色遮光瓶、有色遮光袋，保存時請收入外盒並置於避免受光線照射之處保管。此外，請勿存放於冰箱內。

請勿置於汽車儀表板等高溫場所。（可能造成容器變形或藥液品質惡化）

收於褲子後側口袋等處可能造成瓶口開啟，敬請留意。

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。