

IRIS FON BREAK

- ◆现代人因智能手机造成眼睛疲劳，这是由于持续近距离对焦造成睫状肌持续收缩，且近距离受到光线不断照射，以及上下左右细微持续转动眼球看画面所引起的。
- ◆IRIS FON BREAK 改善因长时间工作导致光损伤引起的眼睛疲劳和炎症。
- ◆除了含有改善聚焦调节功能的成分外，还以各自认证标准内最大浓度配合了营养眼睛及促进角膜组织代谢的成分*1。最强*2 清凉感爽快沁心。
- ◆配合了日本国内产品中最多*3 的 12 种有效成分。
 - ※1 配合了一般用眼科用药制造销售认证标准内最大浓度
 - ※2 在 IRIS 系列内
 - ※3 配合了一般用眼科用药制造销售认证标准内最多种有效成分

效能

因紫外线等光线引发的眼炎（雪盲等）、眼睛疲劳、结膜充血、眼睛发痒、眼病预防（游泳后、灰尘或汗液进入眼睛时等）、眼脸炎（眼脸糜烂）、视线模糊（眼哆较多时等）、佩戴硬性隐形眼镜时的不适感

用法及用量

请按 1 天 5~6 次、1 次 2~3 滴点眼。

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 过量使用有可能会感觉异常眩光或反而导致充血。
- 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
- 容器端部请勿触碰眼皮、睫毛。且，请勿使用混浊的产品。
- 请勿戴着软性隐形眼镜使用。
- 仅限作为滴眼药水使用。

成分

甲基硫酸新斯的明 0.005%
牛磺酸 1%
L-天冬氨酸钾 0.9%
吡哆醇盐酸盐（维生素 B₆） 0.05%
泛醇 0.05%
黄素腺嘌呤二核苷酸钠（活性型维生素 B₂） 0.05%
ε-氨基己酸 1%
盐酸小檗碱 0.015%
甘草酸二钾 0.1%
盐酸四氢唑林 0.01%
马来酸氯苯那敏 0.03%
硫酸软骨素钠 0.05%

添加剂

聚山梨酯 80, 桉树油, l-薄荷醇, 乙二胺四乙酸钠, 硼酸, 苯扎氯铵, pH 调节剂

注意

用本药剂滴眼后，有时口中会感觉到甜味，这是因为有效成分甘草酸二钾所引起的，因此不用担心。

使用注意事项

咨询事项

- ◆以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者正在接受医师治疗的人群。
 - 因药物等出现过过敏症状的人群。
 - 拥有以下症状的人群。
 - 眼睛剧烈疼痛
 - 接受以下诊断的人群。
 - 青光眼
- ◆使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：起疹、发红，发痒

眼睛：充血，发痒，红肿

- 下述情况时请停止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者未改善视线模糊时。
使用 5~6 天后症状仍无改善时。

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 请勿与其他人共用。
- 请勿置于汽车的仪表板等高温下。(会发生容器变形或药液的质量劣化)
- 滴眼过程中如有药液溢出发生衣物等染色，请立即用水清洗。(本药剂所含的黄色成分为盐酸小檗碱水合物及维生素 B₂)
- 请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。(为了保证质量)
- 根据保存状态，成分的结晶可能会附着在容器的前端或盖子内侧。此时，请用干净的纱布等轻轻擦拭后使用。

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。