

사용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

스마트폰 때문에 혹사한 눈의 피로에

IRIS FON REFRESH IRIS Refresh

제2류 의약품
(일반의약품)

<안약>

- ◆ 현대인들이 스마트폰을 사용할 때 초점을 계속 가까이 맞추면 모양체근이 계속 수축되고 가까운 거리에서 빛을 계속 쬐거나 화면을 움직이면 상하 좌우로 미세하게 눈이 계속 움직이기 때문에 눈이 피로하게 됩니다.
 - ◆ IRIS FON REFRESH는 장시간 작업으로 각막이 건조해져서 생기는 눈의 피로를 개선합니다.
 - ◆ 초점 조절 기능 개선 성분과 더불어 각막 회복·보호 성분을 각각 기준 내 최대 농도 배합*1. 지속되는 청량감으로 축축하게 리프레시
 - ◆ 일본 내 최다*2 12종류의 유효 성분 배합.
 - *1 일반용 안과용 약 제 조 판매 승인 기준 내 최대 농도 배합
 - *2 일반용 안과용 약 제 조 판매 승인 기준 내 최다 유효 성분수 배합
- 승인 기준은 승인 사무의 효율성을 높이기 위해 후생노동성이 규정한 의약품의 범위임



사용상의 주의사항



상담

1 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

- (1) 의사에게 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 발현한 적이 있는 환자.
- (3) 다음과 같은 증상이 있는 사람.
극심한 눈 통증
- (4) 다음 진단을 받은 사람.
녹내장

2 사용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움증
눈	충혈, 가려움증, 부기, 시리고 아픔

3 다음과 같은 경우에는 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

- (1) 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우.
- (2) 5~6일 동안 사용해도 증상이 나아지지 않는 경우.

효능

눈 침침(눈곱이 많이 낄 때), 눈의 피로, 결막 충혈, 눈 가려움증, 눈병 예방(수영 후, 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때 등), 안검염(눈꺼풀 진무름), 자외선 또는 기타 광선으로 인한 안염(설맹 등), 하드 콘택트 렌즈 착용 시 불편감

용법·용량

하루에 5~6회, 한 번에 2~3방울 점안하십시오.

[주의]

- (1) 정해진 용법·용량을 반드시 준수하십시오.
- (2) 지나치게 사용하면 눈부심이 비정상적으로 느껴지거나 오히려 충혈이 발생할 수 있습니다.
- (3) 어린이가 사용할 경우 보호자의 지도 감독 하에 사용해야 합니다.
- (4) 용기 끝이 눈꺼풀이나 눈썹에 닿지 않게 하십시오. 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- (5) 소프트 콘택트 렌즈를 착용한 상태로 사용하지 마십시오.
- (6) 점안용으로만 하십시오.

성분

성분	분량	효능
네오스티그민 메틸 황산염	0.005%	초점 조절 기능 개선 작용을 통해 눈의 피로를 개선합니다.
콘드로이틴 황산에스테르나트륨	0.5%	눈물을 유지하는 작용으로 각막 표면을 보호하고 눈에 수분을 유지합니다.
알란토인	0.3%	각막 조직을 복구합니다.
아세트산 d- α -토코페롤(천연 비타민 E)	0.05%	혈액 순환을 촉진하고 눈의 피로를 개선합니다.
시아노코발라민(비타민 B ₁₂)	0.016%	시신경 기능을 조절하여 눈의 피로를 개선합니다.
엽실론 - 아미노카프론산	0.1%	눈의 염증을 줄입니다.
글리시리진산이칼륨	0.08%	
타우린	0.8%	눈에 중요한 영양분을 공급하고 눈의 피로를 개선합니다.
L-아스파라긴산칼륨	0.2%	
피리독신 염산염(비타민 B ₆)	0.02%	눈의 조직 대사를 촉진합니다(눈의 피로를 개선).
클로르페니라민말레산염	0.03%	항히스타민 작용으로 눈의 가려움을 줄여줍니다.
염산테트라히드로졸린	0.01%	결막(흰자위 부분 등)의 충혈을 진정시킵니다.

첨가물: 폴리소르베이트 80, 폴리옥시에틸렌 경화피마자유, 에탄올, 1-멘톨, 게라니올, 클로로부탄올, 에데트산 Na, 붕산, 폴리비닐 알코올(부분 겹화물), 염화벤잘코늄, 등장화제, pH 조절제

[주의]

본 약제를 점안하면 입안에 단맛이 느껴질 수 있습니다. 이것은 유효 성분인 글리시리진산이칼륨 때문이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.


보관 및 취급상의 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 뚜껑을 완전히 닫아 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- (4) 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.
- (5) 차량의 대시보드와 같이 온도가 높은 곳에 방치하지 마십시오. (용기가 변형되거나 약액 품질이 저하될 수 있습니다)
- (6) 점안 중에 약액이 흘러 옷이 착색되면 즉시 물로 씻어내십시오. (본 약제가 빨간색인 것은 성분 중 비타민 B₁₂가 함유되어 있기 때문입니다)
- (7) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 또 개봉 후에는 사용기한이 남아 있어도 가능한 한 빨리 사용하십시오. (품질 유지를 위해)
- (8) 보존 상태에 따라 성분의 결정이 용기 입구 또는 뚜껑 안쪽에 묻을 수 있습니다. 이 때는 깨끗한 거즈로 가볍게 닦아낸 후 사용하십시오.



안약 점안 시 주의사항과 올바른 점안 방법

뚜껑 개폐 방법 반드시 뚜껑을 위로 향하게 하고 개폐하십시오.



용기의 넓은 부분을 잡고 개폐하면 약액이 튀어나올 수 있습니다.

주의사항

- 용기 끝이 눈꺼풀이나 눈썹에 닿으면 눈곱이나 잡균 등으로 인해 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있으므로 주의하십시오.

올바른 점안 방법

- 손을 잘 씻고 눈에 직접 손가락이 닿지 않도록 하십시오.
- 살짝 고개를 들고 손가락으로 아래 눈꺼풀을 내린 후 눈꺼풀 안쪽에 방울을 떨어뜨립니다.



[다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항]

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변적이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.