

TAISHO STOMATITIS CHEWABLE TABLETS

第三类医药品
口腔溃疡药

◆大正口腔溃疡咀嚼片是在口中快速溶化的，对于刺痛的口腔溃疡具有显著效果的口腔溃疡内服药。■无水也可服用，不管在什么场合都可以简单服用。

效能或效果

口腔溃疡
咽炎，扁桃体炎（咽喉疼痛、咽喉红肿）

用法及用量

请按以下用量在口中咬碎或溶解后服用：
成年人（15岁以上），1天3次，1次2片
7岁~14岁，1天3次，1次3片
未满7岁，不宜服用

成分及分量

6片中
传明酸
750mg
甘草酸二钾
63mg
烟酰胺
60mg
吡哆醇盐酸盐（维生素B6）
50mg
核黄素
12mg

添加剂

纤维素，二氧化硅，玉米淀粉，D-甘露醇，交联聚维酮，阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物），乙酰磺胺酸钾，三氯蔗糖，柠檬酸，硬脂酸镁，香料，辛烯基琥珀酸淀粉钠

成分及分量相关注意

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素B2引起的现象，因此不用担心

使用注意事项

禁止事项

- （若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）
- 在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品
含甘草或其成分甘草甜素物的内服药等
含传明酸物的内服药等（鼻炎用内服药、感冒药、解热镇痛药、镇咳祛痰药等）
 - 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者
孕妇、哺乳期女性或有怀孕可能性的人群。
老年人。
因药物等引起过过敏症状的人群。
拥有以下症状的人群
浮肿
接受以下诊断的人群
高血压
心脏病
肾脏病
患有血栓的人群（脑血栓、心肌梗塞、血栓性静脉炎）
可能出现血栓症的人群
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：
起疹、发红
发痒
消化系统：
恶心、呕吐
烧心

食欲不振或食欲增加

精神神经系统：

头晕

泌尿系统：

尿频

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

假性醛固酮增多症、肌病：除了四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者
腹泻

●若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）

本药剂为了防止光线引起药变质,内袋（铝袋）一旦开封后，保管时请放回盒子中等，置于光线照射不到的场所保管。

请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内服用。（为了保证质量）

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任