

大正口内炎チュアブル錠

◆大正口内炎チュアブル錠は、お口の中ですばやく溶けて、痛くてしみる口内炎にすぐれた効果を発揮する口内炎内服薬です。■水なしでも服用でき、場所を選ばずどこでも簡単に服用できます。

効能・効果

口内炎
咽頭炎・扁桃炎（のどのはれ、のどの痛み）

用法・用量

次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。

成人（15才以上）、1回2錠、1日3回

7～14才、1回1錠、1日3回

7才未満、服用しないこと

成分及び分量

6錠中
トラネキサム酸
750mg
グリチルリチン酸二カリウム
63mg
ニコチン酸アミド
60mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）
50mg
リボフラビン（ビタミンB2）
12mg

添加物

セルロース、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、クロスボドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、ステアリン酸Mg、香料、オクテニルコハク酸デンプンNa

成分及び分量に関連する注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
甘草（カンゾウ）又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬
トラネキサム酸を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、かぜ薬、熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等）
- 長期連用しないこと

相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

妊婦、授乳婦又は妊娠していると思われる人。

高齢者。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の症状のある人。

むくみ

次の診断を受けた人。

高血圧

心臓病

腎臓病

血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎）

血栓症を起こすおそれのある人

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

消化器：

吐き気・嘔吐

胸やけ

食欲不振 または食欲増進

精神神経系：

めまい

泌尿器：

頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

●5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）

光による変色を防ぐため、内袋（アルミ袋）開封後は箱に戻すなど、光の当たらない所に保管してください。

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6か月以内に服用してください。（品質保持のため）

11

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。