

TAISHO STOMATITIS OINTMENT QUICK CARE

指定第二類醫藥品
口腔潰瘍用藥

◆大正Quick Care口腔炎軟膏為治療口腔炎所研發的軟膏。患部密合度佳，即使用於口腔內仍可長時間包覆患部。■口腔炎（口瘡）為何…出現於兩頰或唇、舌內側等處，1~數個伴隨疼痛症狀，周圍泛紅而中央出現淺淺下凹的白色圓形潰瘍（直徑不滿10mm）之總稱。成因尚未明確，據說可能與壓力、疲勞或營養失衡有關。

療效或效果

口腔炎（口瘡）

用法及用量

請1天1~數次，適量地塗抹於患處。

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

本藥劑僅供口腔使用，請勿用於口腔以外的部位。

請勿用作假牙黏著等治療以外的用途使用。

疼痛消失後請結束使用。

成分及分量

100g中

Triamcinolone Acetonide 0.1g

添加劑

Xylitol ,Carboxyvinyl polymer,Hypromellose,Hydrocarbon gel,flavor,l-Menthol

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

符合下列情形者請勿使用。

可能罹患感染性口腔炎者

用紗布等擦拭後很容易就剝落的白斑於整個口腔內擴散者。（可能罹患念珠菌感染症）

患處有黃色膿瘡者。（可能罹患細菌感染症）

口腔內長出很多米粒般至紅豆般大小的小水疱者；口腔黏膜以外的嘴唇及皮膚亦有水疱及出疹者。（可能罹患病毒感染症）

發燒、食慾不振、全身倦怠、淋巴節腫大等有全身症狀者。（可能罹患病毒感染症）

伴隨口腔感染者。

（曾有報告指出使用類固醇而出現感染症惡化的病例，因此請勿用於齒槽膿漏、牙齦炎等口腔感染部位）

使用5天症狀仍未見改善者。

使用1~2天症狀惡化者。

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師或牙科醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

孕婦或可能懷孕的人。

正在哺乳的人。

患部為廣範圍的人。

年長者。

●使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

口腔內：白斑（可能罹患念珠菌感染症）、患部出現黃色膿瘡者（可能罹患細菌感染症）

其他：過敏症狀（支氣管氣喘發作、浮腫等）

使用本藥劑後如出現下列症狀，可能屬於感染症或其他疾病所造成的口腔炎，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

發燒

食慾不振、全身倦怠、淋巴節腫大、水疱（口腔內以外）、口腔內患部蔓延至大範圍、眼睛疼痛、視力模糊、外陰部潰瘍

發疹、發紅

發癢

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿使用超過使用期限的產品。

此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。