

◆大正A口腔炎軟膏為治療口腔炎、口角炎所研發的軟膏。患部密合度佳，即使用於口腔內仍可長時間包覆患部。

療效或效果

嘴唇乾裂、嘴唇潰爛、口腔炎、舌炎
口角炎、口唇炎

用法及用量

請適量地1天2~4次塗抹於患處。
請務必遵守規定用法、用量。
請勿於患部或其周圍髒污的情況下使用。
請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗，立刻接受眼科醫師的診療。
兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。
僅供口腔內或口唇部位使用。
請避免與其他外用藥劑用於同一部位。

成分及分量

100g中
Cetylpyridinium Chloride 0.1g
Allantoin 0.5g

添加劑

Xylitol ,Carboxyvinyl polymer,Hypromellose(Hydroxypropylmethylcellulose),Hydrocarbon gel,flavor,l-Menthol

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)
請勿用於下列部位。
潰爛嚴重的患部。

諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
嬰兒、幼童。
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者皮膚：
口腔
發疹、發紅
發癢
- 即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
請勿使用超過使用期限的產品。
此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

31

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- ・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- ・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- ・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- ・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。