

TAISHO STOMATITIS PATCH QUICK CARE

指定第二类医药品
口腔溃疡用治疗药

◆口腔溃疡贴片大正Quick Care是，“贴的”口腔溃疡治疗药。在口腔内部具有良好的附着力，紧紧覆盖防止患处受到刺激，且成分会持续发挥作用。

效能或效果

口腔溃疡（口疮性）

用法及用量

成年人（15岁以上）

儿童（5岁以上）

每患处1天1~2次，1次1张，请粘着在患处粘膜上使用。

未满5岁

不宜使用

请严格遵守规定的用法用量。

本药剂不会溶解。过一段时间会自然脱落。（请不要强行撕下）

本药剂为口腔内粘膜贴剂，请勿内服。

如果痛感消失，请停止使用。（使用中的贴剂不用撕下）

请勿让未满5岁的婴幼儿使用。

5岁以上的儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。

当儿童使用时，请注意贴好后儿童有可能会用手指撕下。

如果错误地吞下，请在患处重新贴上新药。万一，症状发生变化等有不安的情况，请咨询医生、牙科医生、药剂师或登录贩卖者。

如果使用方法错误会粘不上，因此请仔细阅读使用方法并正确使用。

在患处粘膜上粘贴本药剂后，用舌头等用力碰，有可能会掉落，因此请注意。

掉落的药剂请勿吞下，请丢弃。

成分及分量

1张（1个贴片）中

Triamcinolone Acetonide 0.025mg

添加剂

Polyacrylic acid, Triethyl citrate, Hypromellose, Ethylcellulose, Castor oil, Titanium oxide, New coccine

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

下述人群请不要使用。

疑似感染性口腔溃疡的人群

●以下人群在使用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

用纱布等擦拭可以容易脱落的白斑蔓延在整个口腔内部的人群。（可能患有念珠菌性感染症）

患处伴有黄色脓状物的人群。（可能患有细菌感染症）

口腔内部多发米粒大小~小豆大小水泡的人群、口腔粘膜以外的嘴唇、皮肤上也有水泡、起疹的人。（可能患有病毒感染症）

出现发烧、食欲不振、全身倦怠感、淋巴结的肿胀等全身症状的人群。（可能患有病毒感染症）

口腔内部伴有感染的人群。

（有报告称因使用类固醇剂导致感染症恶化，因此请勿用于牙槽脓肿、牙龈炎等口腔内部有感染的部位）

使用5天仍不见症状改善的人群。

使用1~2天出现症状恶化的人群。

咨询事项

●以下人群在使用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师或牙科医师治疗的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

孕妇或有其可能性的人群

哺乳期人群

患处范围较大的人群。

老年人

●使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

其他：过敏症状（支气管哮喘发作、浮肿等）

在服用本药剂后，如果出现以下症状时，有可能是传染病引起的口腔溃疡或其他疾病引起的口腔溃疡，请咨询医生、牙科医生、药剂师或登录贩卖者

口腔内部：白斑（可能患有念珠菌性感染症）、患处伴有黄色脓状物（可能患有细菌感染症）

发烧

食欲不振、全身倦怠感、淋巴结肿胀、水泡（口腔内部以外）、口腔内的患处广范围蔓延、眼睛疼痛、视线模糊、外阴部溃疡

起疹、发红
发痒

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)

为了保证质量，开封后未使用的部分请放进原包装袋，并将开口折好保管。

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。(为了保证质量)

21

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任