

口内炎パッチ大正 A

◆口内炎パッチ大正 A は、“貼る”口内炎・舌炎治療薬です。口腔内ですぐれた付着力をもち、患部を刺激からしっかりカバーし、また、成分が持続的に作用します。

効能・効果

口内炎、舌炎

用法・用量

1 患部に 1 回 1 枚、1 日 1 ～ 4 回、患部粘膜に付着させて用いてください。
* 本剤は、5 才未満の乳幼児には使用させないでください。
定められた用法・用量を厳守してください。
本剤は溶けません。時間が経つと自然にはがれます。(無理にはがさないでください)
本剤は口腔内粘膜貼付剤ですので、内服しないでください。
5 才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
小児への使用においては、貼付後、指ではがしとるおそれがありますので注意してください。
使用方法をまちがえると付着しないことがあるので、使用方法をよく読んで正しく使用してください。
はがれたものは飲みこまずに捨ててください。

成分及び分量

1 枚 (1 パッチ) 中
シコンエキス 0.10mg (シコンとして4.55mg)
グリチルレチン酸 0.15mg

添加物

ポリアクリル酸,クエン酸トリエチル,ヒプロメロース,エチルセルロース,ヒマシ油,酸化チタン

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師又は歯科医師の治療を受けている人。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
症状が慢性的な人
患部が広範囲の人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
- 5～6 日間使用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
小児の手のとどかない所に保管してください。
他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
未使用分は袋に入れ、開封口を折りまげて保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

73

【OTC 医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。