

# STOMATITIS PATCH TAISHO A

제3류 의약품  
구내염용 약

◆구내염 패치 다이쇼A는 '붙이는' 구내염, 설염 치료약입니다. 구강 내에서 뛰어난 부착력을 보이며, 환부를 자극으로부터 완전히 커버하고 성분이 지속적으로 작용합니다.

## 효능 또는 효과

구내염, 설염

## 용법 및 용량

1환부에 1회 1장, 1일 1~4회, 환부 점막에 부착시켜 사용하십시오.  
\* 본제는 5세 미만의 영유아에게는 사용하지 마십시오.  
정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.  
본제는 녹지 않습니다. 시간이 경과하면 자연스럽게 벗겨집니다.(무리해서 벗기지 마십시오.)  
본제는 구강내 점막 첨부제이므로 내복하지 마십시오.  
5세 이상의 소아에게 사용하게 할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용하도록 하십시오.  
소아에게 사용할 경우는 붙인 후 손가락으로 벗겨낼 우려가 있으므로 주의하십시오.  
사용방법을 틀리면 부착되지 않을 수 있으므로, 사용방법을 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.  
벗겨진 것은 삼키지 말고 버리십시오.

## 성분 및 분량

In 1 peace (1 patch)  
Lithospermum Root Extract 0.10mg (equivalent to 4.55 mg of the crude drug)  
Glycyrrhethinic Acid 0.15mg

## 첨가물

Polyacrylic acid, Triethyl citrate, Hypromellose, Ethylcellulose, Castor oil, Titanium oxide

## 사용상의 주의

### 상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것  
의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.  
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.  
증상이 만성적인 사람  
환부 범위가 넓은 사람.
- 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.  
피부:  
발진·발적  
가려움
- 5~6일간 사용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

## 보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.  
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.  
(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)  
미사용분은 봉투에 넣어 입구를 접어서 보관하십시오.  
사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.  
또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.(품질유지를 위하여)

73

### 【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공사(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공사(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..