

# LIPOVITAN D

◆恢复疲劳·营养补充

## 效能

- ★疲劳的恢复和预防
- ★体力、身体抵抗力以及集中力的维持和改善
- ★改善和预防在日常生活中因营养不良引起的身体不适：肩部、颈部、腰部以及膝盖的不适、容易疲劳、疲劳累积、没有体力、身体沉重、身体疲倦、皮肤问题（皮肤粗糙、皮肤干燥）、宿醉引起的食欲不振及疲倦感、眼睛疲劳
- ★虚弱体质（包括伴随年龄增长出现的身体虚弱。）引起的身体不适的改善和预防：骨骼和牙齿的衰弱
- ★患病期间及患病后的体力不支时、伴随发烧的消耗性疾病时、食欲不振时、孕期哺乳期以及产前产后等的营养补充

## 用法及用量

成年人（15岁以上），请按1天1次1支（100mL）服用。

未满15岁，不宜使用。

## 注意

请严格遵守规定的用法用量。（同时服用其他含有维生素等的产品时请注意不要过量摄取）

## 成分

100mL 中  
牛磺酸 1000mg  
肌醇 50mg  
烟酰胺 20mg  
硝酸硫胺（维生素B<sub>1</sub>） 5mg  
核黄素磷酸钠（维生素B<sub>2</sub>） 5mg  
吡哆醇盐酸盐（维生素B<sub>6</sub>） 5mg  
无水咖啡因 50mg

## 添加剂

白糖，D-山梨醇，柠檬酸，苯甲酸钠，香料，甘油，香兰素

## 注意

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素B<sub>2</sub>引起的现象，因此不用担心。

## 使用注意事项

### 咨询事项

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者  
    皮肤：起疹  
    消化系统：胃部不适
- 服用后有可能会出现下述症状，如果这些症状持续或加重，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者  
    腹泻
- 持续服用一段时间仍不见症状好转时，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请勿服用超过使用期限的产品。

91

### 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。