

LIPOVITAN D

◆피로 회복 · 영양 보급

효능

- ★ 피로 회복 · 예방
- ★ 체력, 신체저항력 또는 집중력 유지 · 개선
- ★ 일상생활의 영양불량에 따른 몸 컨디션 개선 · 예방: 어깨 · 목 · 허리 또는 무릎 통증, 쉽게 피로감을 느낀다 · 피로가 남는다 · 체력이 없다 · 몸이 무겁다 · 몸이 나른하다, 피부 트러블(피부거침, 피부건조), 숙취에 따른 식욕저하 · 나른함, 눈의 피로감
- ★ 허약체질(가령에 의한 신체허약을 포함한다.)에 따른 몸 컨디션 개선 · 예방: 뼈 또는 치아 쇠퇴
- ★ 병중병후의 체력저하 시, 발열을 수반하는 소모성질환 시, 식욕부진 시, 임신 수유기 또는 산전산후 등의 영양보급

용법 및 용량

성인(15 세 이상) 1 일 1 회 1 병(100mL)을 복용하십시오.

※ 15 세 미만은 복용하지 마십시오.

주의

정해진 용법 · 용량을 엄수해 주십시오.(다른 비타민 등을 함유하는 제품을 동시에 복용하는 경우에는 과잉 섭취 등에 주의하십시오)

성분

100mL 중
 타우린 1000mg
 이노시톨 50mg
 니코틴산 아미드 20mg
 티아민 질산염(비타민 B₁) 5mg
 리보플라빈 인산 에스테르 나트륨(비타민 B₂) 5mg
 피리독신 염산염(비타민 B₆) 5mg
 무수카페인 50mg

첨가물

백당, D-소르비톨, 구연산, 안식향산 나트륨, 향료, 글리세린, 바닐린

주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 비타민 B₂가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

사용상의 주의

상담할 내용

- 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.
 피부: 발진
 소화기: 위부 불쾌감
- 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.
 설사
- 한동안 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.