

LIPOVITAN D HYPER

자양강장·영양 보급

효능

- ★육체 피로·병중 및 병후·식욕 부진·영양 장애·발열성 소모성 질환·임신 수유기 등의 경우의 영양공급
- ★자양강장
- ★허약 체질

용법 및 용량

성인(15 세 이상) 1 일 1 회 1 병(100mL)을 복용하십시오.

※15 세 미만은 복용하지 마십시오.

주의

- 정해진 용법 및 용량을 엄수해 주십시오.(다른 비타민 등을 함유하는 제제를 동시에 복용하는 경우에는 과잉 섭취 등에 주의하십시오)
- 본제는 생약 성분을 포함하므로 드물게 침전물이 생길 수 있지만, 약효는 변함 없습니다. 잘 흔들어서 복용하십시오.

성분

100mL 중

타우린 3000mg

디이소프로필아민 디클로로아세테이트 20mg

로열젤리 100mg

카르니틴 염화물 50mg

티아민 질산염(비타민 B₁) 10mg

리보플라빈 인산 에스테르 나트륨(비타민 B₂) 5mg

피리독신 염산염(비타민 B₆) 10mg

이노시톨 100mg

니코틴산 아마이드 20mg

무수카페인 50mg

첨가물

백당, D-소르비톨, 아세살팜 칼륨, 수크랄로오스, 스테비아 추출정제물, 구연산, 구연산나트륨, 포비돈, 갈산프로필, 안식향산 나트륨, 캐러멜, 향료, 글리세린

주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 비타민 B₂가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

사용상의 주의

상담할 내용

- 다음과 같은 경우는 즉시 복용을 중단하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상담하십시오
복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우.
피부: 발진
소화기: 위부 불쾌감
한동안 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우.
- 다음의 증상이 나타날 수 있으므로, 이 같은 증상이 계속되거나 증강될 경우는, 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상담하십시오
설사

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.