

# LIPOVITAN DX $\alpha$

- ◆LIPOVITAN DX $\alpha$  含有助消解日常生活疲勞的牛磺酸、維生素 B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>6</sub> 等 LIPOVITAN 系列基礎配方，並含維生素 B<sub>12</sub>、維生素 C、維生素 E、肉鹼、氨基酸以及天然藥材。1 日 1 次的服用對日常生活當中所感到的「疲勞」發揮出色效果。
- ◆對日常生活因營養不良所帶來的眼睛疲勞及血液循環不佳發揮改善、預防效果。
- ◆特別對於「隨年齡增長而易於感到疲勞、體力不足」的中高齡族群，積極飲用能夠幫助精神充沛，活力十足地度過每一天。

## 療效

- ★恢復及預防疲勞
- ★改善及預防在日常生活中因營養不良而引起的身體不適
  - 容易疲倦、疲勞累積、失去體力、身體沉重、倦怠感
  - 肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適
  - 因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感
  - 難以入睡、淺睡、難以睡醒
  - 皮膚狀況不佳(皮膚粗糙、皮膚乾燥)
  - 容易發冷、血液循環不佳
  - 眼睛疲勞
- ★維持及改善體力、身體抵抗力及集中力
- ★改善及預防虛弱體質(包括隨年齡增加而變得身體虛弱)引起的身體不適
  - 容易疲倦、疲勞累積、失去體力、身體沉重、倦怠感
  - 肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適
  - 難以入睡、淺睡、難以睡醒
  - 皮膚狀況不佳(皮膚粗糙、皮膚乾燥)
  - 容易發冷、血液循環不佳
  - 腸胃弱，容易有腹痛及腹瀉
- ★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

## 用法及用量

請用冷水或微溫水服用以下用量。  
成人 (15 歲以上)，1 次 3 錠，1 天 1 次  
未滿 15 歲者，請勿服用

### 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。(若服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量)
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。(可能造成變色等而影響品質)
- 瓶內以包裝紙包覆之物為乾燥劑，請勿服用。

## 成分

3 片中  
牛磺酸 500mg  
生育醇醋酸酯 (維生素 E) 10mg  
硝酸硫胺 (維生素 B<sub>1</sub>) 10mg  
肉鹼鹽酸鹽 10mg  
核黃素 (維生素 B<sub>2</sub>) 5mg  
甘氨酸 5mg  
鹽酸吡哆辛 (維生素 B<sub>6</sub>) 5mg  
山藥 10mg  
氰鈷胺明 (維生素 B<sub>12</sub>) 0.03mg  
乾燥刺五加提取物 8mg (相當於 200mg 的刺五加)  
抗壞血酸鈣 100mg (含維生素 C 82.6mg)

### 添加劑

二氧化矽，白糖，明膠，山梨糖醇單月桂酸脂，滑石，脂肪酸甘油酯，二氧化矽，纖維素，羥丙基纖維素，硬脂酸鎂，聚乙二醇，二氧化鈦，羥丙甲纖維素，氧化鐵，巴西棕櫚蠟

### 注意事項

- 本製劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但效果並無差異。

- 因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B<sub>2</sub> 的影響，無須擔憂。

## 使用上的注意事項

### 諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
皮膚：出疹  
消化器官：胃部不適感
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
腹瀉
- 即使服用一段期間症狀仍未見改善，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

- 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。(為確保品質)

11

### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。