

복용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

피로 회복 및 영양 부족으로 인한 눈의 피로에

LIPOVITAN DX PLUS

판매명: TAISHO VITAMINt t

<비타민 함유 보건의료품>

지정 의약품

- ◆ LIPOVITAN DX PLUS에는 생활 속 피로와 함께 해 온 리포비탄 시리즈의 베이스 처방인 타우린, 비타민 B₁·B₂·B₆ 외에도 비타민 B₁₂, 비타민 C, 비타민 E, 카르니틴, 글리신, 생약 2종류가 함유되어 있습니다. 1일 1회 복용으로 일상 생활 속에서 느끼는 피로감이 줄어드는 효과를 얻을 수 있습니다.
- ◆ 영양 부족으로 인한 눈의 피로를 개선하고 예방하는 데 도움이 됩니다.
- ◆ 노화로 인한 어깨, 목, 허리 또는 무릎의 기능 저하를 개선하고 예방하는 데 도움이 됩니다.
- ◆ '나이를 먹음에 따라 쉽게 피곤해지는 등 어깨와 목, 허리의 기능 저하를 느끼는' 중장년층이 매일 밝고 활기찬 생활을 하는 데 도움이 되는 제품입니다.



사용상의 주의사항



상담 필요



- 1 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진
소화기	위 불편감

- 2 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해질 경우 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.

설사

- 3 일정 기간 복용해도 증상이 좋아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.

효능

★ 피로 회복 및 예방

★ 일상 생활에서 영양 부족에 따른 신체 기능 저하를 개선하고 예방

- ◇ 쉽게 피곤함·피로감이 남음·체력이 없음·몸이 무거움·몸이 늘어짐
- ◇ 어깨·목·허리 또는 무릎 기능 저하
- ◇ 숙취에 따른 식욕 저하·늘어짐
- ◇ 잠들기가 어려움·깊이 가지 못함·잘 깨지 못함
- ◇ 피부 상태가 좋지 않음(거친 피부, 건조한 피부)
- ◇ 쉽게 차가워짐·혈액순환이 좋지 않음
- ◇ 눈의 피로

★체력, 신체 저항력 또는 집중력의 유지·개선

★허약 체질(노화로 인한 신체 허약 포함) 과 관련된 신체 기능 저하의 개선 및 예방

- ◇ 쉽게 피곤함·피로감이 남음·체력이 없음·몸이 무거움·몸이 늘어짐
- ◇ 어깨·목·허리 또는 무릎 기능 저하
- ◇ 잠들기가 어려움·깊이 가지 못함·잘 깨지 못함
- ◇ 피부 상태가 좋지 않음(거친 피부, 건조한 피부)
- ◇ 쉽게 차가워짐·혈액순환이 좋지 않음
- ◇ 위장이 약해 자주 복통이나 설사를 일으킴

★아플 때나 아픈 후 체력 저하 시, 발열을 동반한 소모성 질환 시, 식욕 부진 시, 임신수유기 또는 산전후 등의 영양 보충

용법·용량

물 또는 미지근한 물과 함께 다음 용량을 복용하십시오.

연령	1회 용량	복용 횟수
성인(15세 이상)	3정 	1일 1회
15세 미만	복용하지 마십시오	

[주의]

- 정해진 용법·용량을 엄격하게 준수하십시오. (다른 비타민이 함유된 제품을 동시에 복용할 경우에는 과잉 섭취에 주의하십시오.)
- 젖은 손으로 만진 정제는 다시 병에 넣지 마십시오. (변색의 원인이 되며 품질 유지가 곤란할 수 있습니다.)
- 병 안의 포장지에 담긴 것은 습기 제거제이므로 복용하지 마십시오.

처음 복용할 때

- 병 입구 스티커를 떼어내 버리십시오.
- 충전재를 꺼내 버리십시오.
(이 충전재는 운송 중 정제의 파손을 방지하기 위한 것입니다. 병에 넣었다 뺐다 하면 이물질이 들어갈 수 있습니다.)



성분

3정 중

성분	분량	성분	분량
타우린	500mg	토코페롤 아세트산 에스테르(비타민 E)	10mg
티아민 질화물(비타민 B ₁)	10mg	카르니틴 염화물	10mg
리보플라빈(비타민 B ₂)	5mg	글리신	5mg
피리독신 염산염(비타민 B ₆)	5mg	산야쿠스에	10mg
시아노코발라민(비타민 B ₁₂)	0.03mg	가시오갈피 건조 추출물	8mg(가시오갈피 200mg 상당)
아스코르브산칼슘	100mg(비타민C로서 82.6mg)		

첨가물: 이산화규소, 백당, 젤라틴, 라우린산 소르비탄, 탭크, 글리세린 지방산 에스테르, 무수규산, 셀룰로스, 하이드록시프로필 셀룰로스, 스테아르산 마그네슘, 마크로골, 산화 티타늄, 하이프로멜로스, 삼이산화철, 카나우바 왁스

[주의]

- 본 약제는 생약을 이용한 제품이므로 제품에 따라 색이 다소 다를 수 있지만 효과는 동일합니다.
- 본 약제를 복용하면 소변이 노란색으로 변할 수 있지만 이것은 본 약제 중 비타민 B₂에 의한 것이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

보관 및 취급상의 주의사항

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 장소에 뚜껑을 완전히 닫아 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 바뀌 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 사용기한이 지나지 않았어도 개봉 후에는 6개월 이내에 복용하십시오. (품질 유지를 위해)



【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.