

# NARON TABLETS

- ◆NARON TABLETS 是舒緩頭痛、牙痛、生理痛的解熱鎮痛藥。透過 Acetaminophen、ethenzamide 的解熱鎮痛作用以及 bromovalerylurea 的鎮靜作用，能有效地緩解這些疼痛症狀。
- ◆本藥劑為不含 pyrine 類藥物的解熱鎮痛藥。

## 療效

- ◆頭痛、牙痛、拔牙後的疼痛、經痛（生理痛）、神經痛、肌肉疼痛、腰痛、肩膀痠痛、關節痛、咽喉痛（喉嚨痛）、耳朵痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷造成的疼痛（扭傷痛）、外傷痛的鎮痛
- ◆惡寒、發燒時的解熱

## 用法及用量

請用冷水或微溫水服用以下用量，並盡量避免於空腹時服用。請每隔 4 小時以上服用。

15 歲以上，1 次 2 片，1 天 3 次

8 歲~14 歲，1 次 1 片，1 天最多 3 次

未滿 8 歲者，請勿服用

### 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

### 錠劑取出方法

指尖用力按下裝有藥片的 PTP 板的凸出部，弄破背面的鋁箔再取出服用。（以包裝的狀態直接誤吞，會發生穿破食管粘膜等意外事故）

## 成分

2 片中

乙醯胺酚 265mg

鄰乙氧苯甲酰胺 300mg

溴化羥草酸尿素 200mg

無水咖啡因 50mg

### 添加劑

纖維素，羧甲基纖維素鈣，羥丙基纖維素，硬脂酸鎂，硬化油

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

- 下列的人請勿服用
  - 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
  - 曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥，引發氣喘的人。
- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品
  - 其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥、暈車藥
- 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等）
- 服用前後請勿飲酒
- 請勿長期連續服用

### 諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
  - 孕婦或可能懷孕的人。
  - 患有水痘、流感或有其可能性的嬰兒、幼童、兒童（未滿 15 歲）。年長者。
  - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
  - 接受過下列診斷的人。
    - 心臟病，腎臟病，肝臟病，胃潰瘍、十二指腸潰瘍
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：發疹、發紅，發癢

消化系統：惡心、嘔吐、食欲不振

精神神經系統：頭暈

其他：過度的體溫低下

- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。

藥物過敏症候群：皮膚廣泛性發紅，出現全身發疹、發燒、倦怠感、淋巴結（頸部、腋下、腹股溝等）腫大等。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者嗜睡

- 服用 5～6 次症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本說明書諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

### 保管及使用上的注意事項

- ・請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- ・請置於兒童無法觸及之處保管。
- ・請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- ・請勿服用超過使用期限的產品。

71

#### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- ・本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- ・多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- ・多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- ・供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。