

◆NARON顆粒為舒緩頭痛、牙痛、生理痛的解熱鎮痛藥。Acetaminophen、ethenzamide的解熱鎮痛作用以及bromovalerylurea的鎮靜作用有效緩解上述疼痛。■本藥劑為不含pyrine類藥物的解熱鎮痛藥。

療效或效果

1)頭痛、牙痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、耳朵痛、關節痛、神經痛、腰痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、月經痛(生理痛)、外傷痛的鎮痛2)惡寒、發燒時的解熱

用法及用量

請用冷水或微溫水服用以下用量，並盡量避免於空腹時服用。請每隔4小時以上服用。

- 1 5歲以上，1天最多3次，1次1包
 - 1 1歲~1 4歲，1天最多3次，1次2 / 3包
 - 7歲~1 0歲，1天最多3次、1次1 / 2包
 - 3歲~6歲，1天最多3次，1次 1 / 3包
 - 1歲~2歲，1天最多3次，1次1 / 4包
- 未滿1歲者，請勿服用
請務必遵守規定用法、用量。
兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

成分及分量

1包 (1.6 g) 中
Acetaminophen 265mg
Ethenzamide 300mg
Bromvalerylurea 200mg
Anhydrous caffeine 50mg

添加劑

Lactose ,Carboxymethylcellulose calcium ,Hydroxypropylcellulose,Potato starch,Magnesium aluminometasilicate ,l-Menthol

使用上的注意事項

禁止事項

- (若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)
符合下列情形者請勿服用
曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
曾因服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥而引起氣喘者
- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。
其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥、暈車藥
 - 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等。）
- 服用前後請勿飲酒
- 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
患有水痘、流感或有其可能性的嬰兒、幼童、兒童（未滿15歲）。
年長者。
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
接受過下列診斷的人。
心臟病
腎臟病
肝臟病
胃潰瘍、十二指腸潰瘍
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：
發疹、發紅
發癢
消化器官：
噁心
嘔吐
食欲不振
精神神經系統：
頭暈

其他：

過度的體溫低下

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者嗜睡

●即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

單包分次服用時，請將袋口反折保管並於2天內服用完畢。

請勿服用超過使用期限的產品。

61

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。

・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。

・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。

・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。