

ANIMALIN L TABLETS

第三類醫藥品
含維生素保健藥

◆胺基酸屬於三大營養素之一，為構成人體的蛋白質基本單位的重要營養素。●其中，人體中無法自行合成的胺基酸稱則為必需胺基酸。■Animarin L錠為含有必需胺基酸、維生素B群及維生素E的保健藥品。

療效或效果

成年人（15歲以上）

身體疲勞、病中病後、營養障礙、發熱性消耗性疾患

胃腸障礙

懷孕哺乳期等的營養補充

滋養強身

虛弱體質

兒童（7~14歲）

☆兒童的發育時期、偏食兒童、發熱性消耗性疾患、患病中及患病後、胃腸障礙、營養障礙等的營養補充

滋養強身

虛弱體質

用法及用量

請用冷水或微溫水服用以下用量：

成年人（15歲以上），1天1~2次，1次2片

兒童（7~14歲），1天1~2次，1次1片

未滿7歲者，請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色等影響品質）

成分及分量

2片中

L-Isoleucine 30mg

L-Leucine 34mg

L-Lysine Hydrochloride 37.5mg

L-Phenylalanine 20mg

L-Methionine 30mg

L-Threonine 20mg

L-Tryptophan 10mg

L-Valine 30mg

L-Arginine Hydrochloride 20mg

Thiamine Nitrate 10mg

Riboflavin 4mg

Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 15mg

Tocopherol Calcium Succinate 5mg

Nicotinamide 30mg

添加劑

Corn starch ,cellulose,Carboxymethylcellulose calcium (CMC-Ca),Hydroxypropylcellulose,Magnesium stearate,hardened oil,Sugar,Hypromellose,Propylene glycol,Cellulose acetate ,Calcium carbonate ,Talc,Gelatin,Acacia ,anhydrous silicic acid ,Polyoxyethylene po

成分及分量相關的注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

使用上的注意事項

諮詢事項

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹

消化器官：

胃部不適感

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

腹瀉

●即使服用一陣子，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
請勿服用超過使用期限的產品。
此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內使用完畢。（為確保品質）

32

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。