

# TAISHO ANTIDIARRHEALS <for PEDIATRIC USE>

第二类医药品  
止泻药

◆大正止泻(儿童用)在改善不适的腹泻症状的同时,补充因腹泻易消耗的维生素B1、B2。●此药剂为香蕉味,幼小的小孩子也易服用。

## 效能或效果

腹泻、因消化不良导致的腹泻、食物中毒、上吐下泻、因饮水而腹泻、拉肚子、软便

## 用法及用量

以1天3次为限度,请按以下用量并配合水或温开水服用:

5~7岁, 1天不超过3次, 1次1包

3~4岁, 1天不超过3次, 1次2/3包

1~2岁, 1天不超过3次, 1次1/2包

3个月以上~未滿1岁, 1天不超过3次, 1次1/4包

未滿3个月, 不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时,请在监护人的指导监督下服用。

未滿1岁的婴幼儿应优先接受医师诊疗,只有在不得已时才能服用。

## 成分及分量

1包(1.2g)中

Berberine Tannate 30 mg 30mg

Albumin Tannate 440mg

Biodiastase2000 30mg

Thiamine Nitrate 2mg

Riboflavin 1mg

## 添加剂

Potato starch,Sugar,Corn starch ,Magnesium aluminometasilicate ,Hydroxypropylcellulose,flavor,Gelatin,Sorbitan fatty acid ester

## 成分及分量相关注意

服用本药剂,可能会出现尿液变黄的情况,这是因本药剂中的维生素B2引起的现象,因此不用担心

## 使用注意事项

### 禁止事项

本药剂为儿童用药,记载着感止泻药中所规定的一般性注意事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化,或容易出现副作用)

●下述人群不要服用

因本药剂、本药剂成分或牛奶出现过过敏症状的人群

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

伴随有发烧的腹泻人群、便血人群或持续存在粘液便情况的人群。

伴随急性剧烈腹泻、腹痛、腹胀、恶心等症状的腹泻人群。(若强行使用本药剂进行止泻反而可能导致病情恶化。)

老年人

因药物等出现过过敏症状的人群

●服用后若出现下述症状,则可能存在副作用,此时应立即中止服用,并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤:

起疹、发红

发痒

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克(过敏性):服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

即使使用5~6天仍不见症状好转时,请停止使用,并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)

将1包分开服用时,折叠袋口进行保管,并在2天之内服用。

请勿服用超过使用期限的产品。

**【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任