

# TAISHO ANTIDIARRHEALS <for PEDIATRIC USE>

第二類醫藥品  
止瀉藥

◆大正止瀉藥(兒童用)改善不適的腹瀉症狀，同時補充腹瀉所造成的維生素B1、B2流失。■幼童易於服用的香蕉口味藥散。

## 療效或效果

腹瀉、消化不良引起的腹瀉、食物中毒、上吐下瀉、飲水感染、稀爛糞便、軟便

## 用法及用量

請將以下用量最多1天3次，用冷水或微溫水服用。請每隔4小時以上服用。

5～7歲，1天最多3次，1次1包

3～4歲，1天最多3次，1次2/3包

1～2歲，1天最多3次，1次1/2包

3個月以上未滿1歲，1天最多3次，1次1/4包

未滿3個月者，請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

未滿1歲的嬰兒，請以使其接受醫師的診療為優先，僅於不得已的情況下，使其服用。

## 成分及分量

1包(1.2g)中

Berberine Tannate 30 mg 30mg

Albumin Tannate 440mg

Biodiastase2000 30mg

Thiamine Nitrate 2mg

Riboflavin 1mg

## 添加劑

Potato starch,Sugar,Corn starch ,Magnesium aluminometasilicate ,Hydroxypropylcellulose,flavor,Gelatin,Sorbitan fatty acid ester

## 成分及分量相關的注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

本藥劑屬於兒童專用藥物，記載事項為止瀉藥所定一般注意事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

●下列的人請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑的成分、牛奶，引發過敏症狀的人。

### 諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

有伴隨發燒的腹瀉的人、有血便的人或持續黏液便的人。

有伴隨急性的劇烈腹瀉或腹痛、腹部膨脹、噁心等症狀的腹瀉的人。(若以本藥劑勉強止住腹瀉，可能反而使疾病惡化。)

年長者。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克(過敏性)：服用後馬上出現皮膚搔癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

使用5～6天症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)

單包分次服用時，請將袋口反折保管並於2天內服用完畢。

請勿服用超過使用期限的產品。

**【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。