

◆腹泻因过饮过食引起的消化不良或压力等导致肠道运动变得过度活跃、或水分在肠道内部的分泌过剩引起的。◆Pitarito可以减缓过分活跃的肠道运动，抑制肠道内的水分分泌，含促进水分吸收的loperamide hydrochloride。对于严重的腹泻发挥显著的效果。

效能或效果

腹泻、过饮过食引起的腹泻、睡觉着凉引起的腹泻、伴随腹痛的腹泻、食物中毒、因饮水而腹泻、软便

用法及用量

请按以下用量并配合水或温开水服用。如果腹泻止住的话请勿服用。服用间隔时间为4小时以上。

成年人（15岁以上），1天2次，1次2片

未满15岁，不宜服用

〔注意〕

请严格遵守规定的用法用量。

药片的取用方法

·指尖用力按下装有药片的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。

（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

成分及分量

2片中

Loperamide Hydrochloride 0.5mg 0.5mg

Berberine chloride 75mg

Biodiastase2000 45mg

Thiamine Nitrate (Vitamin B1) 7.5mg

Riboflavin (Vitamin B2) 3mg

添加剂

Sugar, Corn starch, cellulose, Magnesium aluminometasilicate, Hydroxypropylcellulose, anhydrous silicic acid, Magnesium stearate, Hypromellose, Macrogol, Titanium oxide, Carnauba wax

〔注意〕

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素B2引起的现象，因此不用担心

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

●下述人群不要服用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

●在服用本药剂期间，不要服用下述任何药物。

肠胃镇痛镇痉药

●服用后不要驾驶交通工具或操作机械类（会出现嗜睡症状）

●请不要在服用前后饮酒

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

伴随有发烧的腹泻人群、便血人群或持续存在粘液便情况的人群。

伴随急性剧烈腹泻、腹痛、腹胀、恶心等症状的腹泻人群。（若强行使用本药剂进行止泻反而可能导致病情恶化。）

必须避免发生便秘的有肛门疾病等的人群。（服用本药剂有可能会引起便秘）

孕妇或有其可能性的人群

哺乳期人群

老年人。

因药物等出现过过敏症状的人群

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：便秘

腹部胀满感

腹部不适

恶心、呕吐

腹痛

食欲不振

精神神经系统：

头晕

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。

肠梗阻样症状（肠堵塞样症状）：伴有剧烈腹痛、停止排气（屁）、呕吐、腹部膨胀感的同时有明显的便秘。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

嗜睡

●若使用2~3天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内服用。（为了保证质量）

51

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任