

◆腹瀉為暴飲暴食所造成的消化不良或因壓力影響而造成腸道過度蠕動、腸道水分分泌過剩所引起。◆Pitaritto含鎮靜蠕動過度的腸道、抑制腸道水分分泌，促進水分吸收的loperamide hydrochloride成分配方，對惱人腹瀉發揮優異效果。

## 療效或效果

腹瀉、暴飲暴食引起的腹瀉、睡覺時著涼引起的腹瀉、伴隨腹痛的腹瀉、食物中毒、飲水感染、軟便

## 用法及用量

請用冷水或微溫水服用以下用量。若腹瀉停止，請勿服用。請每隔4小時以上服用。

成人（15歲以上），1天2次，1次2片

未滿15歲者，請勿服用

## 〔注意事項〕

請務必遵守規定用法、用量。

錠劑取出方法

●如圖所示，以指尖用力按壓藥錠PTP包裝凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出藥錠服用。

（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

## 成分及分量

2片中

Loperamide Hydrochloride 0.5mg 0.5mg

Berberine chloride 75mg

Biodiastase2000 45mg

Thiamine Nitrate (Vitamin B1) 7.5mg

Riboflavin (Vitamin B2) 3mg

## 添加劑

Sugar, Corn starch, cellulose, Magnesium aluminometasilicate, Hydroxypropylcellulose, anhydrous silicic acid, Magnesium stearate, Hypromellose, Macrogol, Titanium oxide, Carnauba wax

## 〔注意事項〕

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

●下列的人請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

●服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

胃腸鎮痛鎮痙藥

●服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等。）

●服用前後請勿飲酒

### 諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

有伴隨發燒的腹瀉的人、有血便的人或持續黏液便的人。

有伴隨急性的劇烈腹瀉或腹痛、腹部膨脹、噁心等症狀的腹瀉的人。（若以本藥劑勉強止住腹瀉，可能反而使疾病惡化。）

患有肛門疾病，必須避免便秘者。（可能因服用本藥劑而發生便秘）

孕婦或可能懷孕的人。

正在哺乳的人。

老年人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

消化器官：便秘

腹部膨脹感

腹部不適感

噁心、嘔吐

腹痛

食欲不振

精神神經系統：

頭暈

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅等持續，或者突然惡化。

腸阻塞般症狀（腸堵塞般症狀）：出現劇烈腹痛、排氣停止（無屁）、嘔吐、伴隨腹部膨脹感的明顯便秘症狀。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者嗜睡

●即使使用2~3天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。（為確保品質）

51

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- ・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- ・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- ・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- ・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。