

PABRON GOLD A <GRANULES>

- ◆ PABRON GOLD A <GRANULES> 은 Guaifenesin 을 비롯해 7 가지 종류의 유효성분을 배합하여 감기, 가래, 목 통증 등 감기 제증상을 개선하는 감기약입니다.
- ◆ 가정의 상비약으로 사용하십시오.

효능

감기의 각종 증상 (기침, 가래, 목의 통증, 재채기, 콧물, 코막힘, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통) 의 완화

용법 및 용량

다음의 양을 식후 가급적 30 분 이내에 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

15 세 이상, 1회 1포, 1일 3회

12 세~14 세, 1회 2/3 포, 1일 3회

12 세 미만, 복용하지 말 것

주의

- 정해진 용법·용량을 염수해 주십시오.
- 소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.

성분

1포 (0.96g) 중

구아이페네신 60mg

디히드로코데인 인산염 8mg

DL-메틸에페드린염산염 20mg

아세트아미노펜 300mg

클로르페니라민말레산염 2.5mg

무수카페인 25mg

리보플라빈 (비타민 B₂) 4mg

첨가물

셀룰로오스, 무수 규산, 감자 녹말, D-만니톨, 하이드록시프로필셀룰로오스, 메타규산알루민산마그네슘, 아스파탐 (L-페닐알라닌화합물), 향료, 바닐린

주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 비타민 B₂가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어나기 쉽습니다)

● 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오

본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

본제 또는 다른 감기약, 해열 진통제를 복용해 천식을 일으킨 적이 있는 사람.

12 세 미만의 소아.

● 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 사용하지 마십시오

다른 감기약, 해열 진통제, 진정제, 진해 거담제, 항히스타민제를 함유하는 내복약 등(비염용 내복약, 멀미약, 알레르기용 약 등)

● 복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 마십시오

(졸음 등이 나타날 수 있습니다)

● 수유 중인 사람은 본제를 복용하지 않거나 본제를 복용할 경우에는 수유를 피하십시오

● 복용 전후는 음주하지 마십시오

● 장기간 계속해서 사용하지 마십시오

상담할 내용

● 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

고령자.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

다음의 증상이 있는 사람.

고열, 배뇨 곤란

다음의 진단을 받은 사람.

갑상선 기능 장애, 당뇨병, 심장병, 고혈압, 간장병, 신장병, 위·십이지장 궤양, 녹내장, 호흡기능 장애, 폐색성 수면시 무호흡증후군, 비만증

● 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

피부: 발진·발적, 가려움

소화기: 메스꺼움 및 구토, 식욕부진

정신신경계: 현기증

비뇨기: 배뇨 곤란

기타: 과도한 체온 저하

● 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.

쇼크 (아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉰소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.

피부 점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증, 급성 범발성 발진성 농포증: 고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적, 뺨개진 피부에 작고 도돌도돌한 것(작은 농포)이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.

약제성 과민증 증후군: 피부가 넓은 범위로 뺨개진다, 전신성 발진, 발열, 몸이 나른하다, 림파절(목, 겨드랑이 밑, 가랑이 등)의 부음 등이 나타난다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.

신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통 (마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.

간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.

천식: 숨을 쉴 때 색색, 휙휙과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.

재생 불량성 빈혈: 푸른 명, 콧피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보인다, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타난다.

무과립구증: 갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.

호흡 억제: 숨이 참, 호흡 곤란 등이 나타난다.

● 복용 후 다음의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

변비, 출음, 입마름

● 5~6 회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 한 포를 나누어 사용하여 남은 양을 복용할 경우에는 봉투 입구부분을 접어서 보관하고 2 일 이내에 복용하십시오.
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

51

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.