

服用前请务必阅读本说明书。
请妥善保管，以便在需要时能随时阅读。

缓解严重的鼻涕、鼻塞、喷嚏，每天服用2次〈长效鼻炎药〉

PABRON RHINITIS CAPSULES Sα

商品名：PABRON RHINITIS CAPSULES Sα 2类药品 〈鼻炎药〉

- ◆ PABRON RHINITIS CAPSULES Sα是每天服用2次就有显著效果的一种鼻炎内服药。
- ◆ 快速溶解起效的白色颗粒和缓慢溶解后起效的橙色颗粒对严重的鼻炎症状具有显著效果。



使用注意事项



禁止事项



(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易发生不良反应和事故)

1 下述人群请勿服用

- (1) 因本品或本品的成分发生过敏症状者。
- (2) 有下述症状者。
前列腺肥大造成的排尿困难
- (3) 接受以下诊断者。
高血压、心脏病、甲状腺疾病、糖尿病

2 服用本品期间，请勿使用以下任一药品

其他鼻炎口服药、含抗组胺药的内服药等
(如感冒药、镇咳祛痰药、晕车药、抗过敏药等)、含盐酸伪麻黄碱或硫酸伪麻黄碱的内服药、胃肠解痉止痛药

3 服用后请勿驾驶操作交通工具或机械类

(可能会出现思睡、视力模糊、异常眩光症状)

4 请勿长期连续使用



咨询事项



1 下述人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售商

- (1) 正在接受医生治疗者。
- (2) 孕妇或可能怀孕的人。
- (3) 哺乳者。
- (4) 老年人。
- (5) 曾因药物等发生过敏症状者。
- (6) 因感冒药、镇咳祛痰药、鼻炎内服药等出现失眠、眩晕、感到乏力、发抖、心悸等症状的人群。
- (7) 有下述症状者。
高热、排尿困难
- (8) 接受以下诊断者。
青光眼、肾病
- (9) 接受单胺氧化酶抑制剂(盐酸司来吉兰等)治疗者。
(盐酸司来吉兰用于治疗帕金森病)

2 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
消化系统	恶心和呕吐、食欲不振
精神神经系统	眩晕、失眠、神经过敏、头痛、痉挛
泌尿系统	排尿困难
其他	面部潮热、异常眩光

偶尔会发生下述严重症状。
此时请立即就医。

症状名称	症状
急性泛发性 发疹性脓疱病	高热、皮肤大面积皮疹/发红、变红的皮肤上出现细小粒状物(小脓包)、浑身发倦、无食欲等症状持续或急剧恶化。

3 服用后可能出现下述症状，若观察到这类症状持续或加剧，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

口干、思睡、便秘、视力模糊

4 如果服用5~6天症状仍未改善，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

功效

缓解急性鼻炎、过敏性鼻炎或鼻窦炎引起的各种症状：

喷嚏、鼻涕（鼻涕过多）、鼻塞、泪眼、咽喉疼痛、头重（头部沉重）



用法用量

请每12小时用水或温水服用以下剂量。


[注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 胶囊的取出方法

如图所示，以指尖用力按压装有胶囊的PTP板凸起部分，弄破背面的铝箔，取出服用。（如果误吞包装，可能会导致食管黏膜等意外事故发生）

〈胶囊取出示意图〉



年龄	1次量	服用次数
15岁以上	2粒胶囊 	每天2次
未满15岁	请勿服用	

成分

2粒胶囊中

成分	含量	作用
盐酸伪麻黄碱	60mg	通过血管收缩作用抑制鼻黏膜充血和肿胀，改善鼻塞。
马来酸卡比沙明	6mg	通过抗组胺作用抑制喷嚏、鼻涕、鼻塞。
颠茄次碱	0.2mg	通过分泌抑制作用，抑制鼻涕，改善泪眼。
无水咖啡因	50mg	缓解鼻炎引起的头重感。

辅料：硅酸铝镁、白糖、玉米淀粉、羟丙基纤维素、硬脂酸镁、纤维素、滑石粉、季铵基甲基丙烯酸酯共聚物、硬脂醇、三油酸山梨坦、日落黄、明胶、十二烷基硫酸钠

储存及操作注意事项

- (1) 请存放在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。（否则会导致误用或变质）
- (4) 请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月内服用。（为保证质量）



【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用的目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文文件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。