

복용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.  
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

심한 콧물·코막힘·재채기에  
1일 2회 복용 <지속성 비염약>

# PABRON RHINITIS CAPSULES Sα

판매명: PABRON RHINITIS CAPSULES Sα

**제2류 의약품** <비염약>

- ◆ PABRON RHINITIS CAPSULES Sα는 1일 2회 복용으로 효과가 우수한 비염 내복약입니다.
- ◆ 흰색 과립은 빠르게 녹아 효과가 바로 나타나기 시작하고 주황색 과립은 천천히 녹아 나중에 효과가 나타나므로 심한 비염 증상 에 잘 듣습니다.



## 사용 시 주의사항



### 금지 사항



(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어날 수 있습니다)

**1 다음 환자는 복용하지 마십시오**

- (1) 본 약제 또는 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
- (2) 다음과 같은 증상이 있는 사람.  
전립선 비대로 인한 배뇨 곤란
- (3) 다음 진단을 받은 사람.  
고혈압, 심장병, 갑상선 기능 장애, 당뇨병

**2 본 약제를 복용하는 동안에는 다음 의약품도 사용하지 마십시오**

기타 비염용 내복약, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(기침약, 진해거담제, 멀미약, 알레르기용 약 등), 염산 슈도에페드린 또는 황산 슈도에페드린을 함유한 내복약, 위장 진통 진경제

**3 복용 후에는 차량 또는 기계를 운전하지 마십시오**  
(졸음이나 눈 침침, 비정상적인 눈부심 증상이 나타날 수 있습니다)

**4 장기간 연속해서 사용하지 마십시오**



### 상담

**1 다음과 같은 사람은 복용하기 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오**

- (1) 의사에게 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 임부 또는 임신 중이라고 생각되는 사람.
- (3) 수유중인 사람.
- (4) 고령자.
- (5) 약물 등으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
- (6) 기침약, 진해거담제, 비염용 내복약 등으로 인해 불면증, 현기증, 무력감, 떨림, 두근거림을 일으킨 적이 있는 사람.
- (7) 다음과 같은 증상이 있는 사람.  
고열, 배뇨 곤란
- (8) 다음 진단을 받은 사람.  
녹내장, 신장병
- (9) 모노아민 산화효소 억제제(셀레길린 염산염 등)로 치료를 받고 있는 사람.  
(셀레길린 염산염은 파킨슨병 치료에 사용됩니다)

**2 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오**

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
소화기	메스꺼움·구토, 식욕 부진
정신신경계	현기증, 불면증, 신경과민증, 두통, 경련
비뇨기	배뇨 곤란
기타	얼굴 화끈거림, 비정상적인 눈부심

드물게 다음과 같은 위중한 증상이 나타날 수 있습니다.  
이 경우 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

증상 명칭	증상
급성 범발성 발진성 농포증	고열, 피부의 광범위한 발진·발적, 붉어진 피부에 알갱이(작은 농포)가 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.

**3 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해질 경우 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오**

입마름, 졸음, 변비, 눈 침침

**4 5~6일간 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오**

## 효능


급성 비염, 알레르기성 비염 또는 부비동염(축농증)으로 인한 다음 증상의 완화:

재채기, 콧물(콧물 과다), 코막힘, 눈물흘림증, 인후통, 머리 무거움



## 용법·용량

다음 용량을 12시간마다 물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회 용량	복용 횟수
15세 이상	캡슐 2개 	1일 2회
15세 미만	복용하지 마십시오	

### [ 주의 ]

- (1) 지정된 용법 및 용량을 반드시 준수하십시오.
- (2) 캡슐을 꺼내는 방법

그림과 같이 캡슐이 들어 있는 PTP 시트의 돌출부를 손가락으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일이 찢어지면 꺼내서 복용하십시오. (실수로 그대로 삼키면 식도 점막이 찢리는 등 예상치 못한 사고로 이어질 수 있습니다)

<캡슐을 꺼내는 그림>



## 성분

2캡슐 중

성분	분량	효능
염산 슈도에페드린	60mg	혈관 수축 작용으로 코점막이 충혈되거나 붓는 것을 억제하여 코막힘을 개선합니다.
카르비녹사민 말레산염	6mg	항히스타민 작용으로 재채기, 콧물, 코막힘을 줄여줍니다.
벨라돈나 총 알칼로이드	0.2mg	분비 억제 작용으로 콧물을 진정시키고 눈물흘림증을 개선합니다.
무수 카페인	50mg	비염에 동반되는 두드통을 완화합니다.

첨가물: 메타규산 알루미늄 산 Mg, 백당, 옥수수 전분, 하이드록시프로필 셀룰로오스, 스테아린산 Mg, 셀룰로오스, 톨크, 아미노알킬 메타크릴레이트 공중합체, 스테아릴 알코올, 트리올레인산 소르비탄, 황색 5호, 젤라틴, 라우릴황산 Na

## 보관 및 취급 시 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 습하지 않은 곳에 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- (4) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 마십시오. 사용기한이 지나지 않았어도 개봉 후에는 6개월 이내에 복용하십시오. (품질 유지를 위해)



### 【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.