

◆百保能鼻炎膠囊 Sa 為每天2次即可發揮優異效果的口服鼻炎藥。■迅速崩解作用的白色顆粒搭配緩慢溶解，後續作用的橙色顆粒，有效緩解令人不適的鼻炎症狀。

療效或效果

緩和因急性鼻炎、過敏性鼻炎或副鼻腔炎的下列各項症狀：打噴嚏、流鼻水（鼻水過多）、鼻塞、流眼淚、喉嚨痛、頭重（頭沉）。

用法及用量

請將以下用量每隔12小時，用冷水或微溫水服用：

1 5 歲以上，1 天 2 次，1 次 2 粒膠囊

未滿15歲者，請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

●膠囊取出方法

●以指尖用力按壓膠囊PTP包裝的凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出膠囊服用。（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

成分及分量

2 粒膠囊中

Pseudoephedrine hydrochloride 60mg

Carbinoxamine maleate 6mg

Belladonna total alkaloid 0.2mg

Anhydrous caffeine 50mg

添加劑

Magnesium aluminometasilicate ,Sugar,Corn starch ,Hydroxypropylcellulose,Magnesium stearate,cellulose,Talc,Ammonio alkyl methacrylate copolymer,Stearyl alcohol ,Sorbitan trioleate,Sunset Yellow FCF ,Gelatin,Sodium lauryl sulfate

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

符合下列情形者請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑成分引發過敏症狀者。

有下列症狀的人。

因前列腺肥大而排尿困難

接受過下列診斷的人。

甲狀腺功能障礙

心臟病

高血壓

糖尿病

服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

其他鼻炎用內服藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（感冒藥、鎮咳祛痰藥、暈車藥、過敏用藥等）、胃腸鎮痛鎮痙藥

含有pseudoephedrine hydrochloride或pseudoephedrine sulfate成分的口服藥

●服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。）

●請勿長期連續服用

諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

正在哺乳的人。

年長者。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

曾因感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎用內服藥等，引發失眠、頭暈、無力感、顫抖、心悸的人。

有下列症狀的人。

發高燒

排尿困難

接受過下列診斷的人。

青光眼

腎臟病

正在以單胺氧化酶抑制劑（鹽酸希利治林等）接受治療的人。

（Selegiline hydrochloride為用於治療帕金森氏症的成分）

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

消化器官：

噁心

嘔吐

食欲不振

精神神經系統：

頭暈

失眠

神經過敏

頭痛

痙攣

泌尿器官：

排尿困難

其他：

臉發燙

異常目眩

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、皮膚廣範圍發疹·發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
口乾、嗜睡、便秘、視力模糊

●即使服用5～6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。（為確保品質）

21

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。