

# PABRON KIDS COLD TABLETS

第二类医药品  
感冒药

◆Pabron Kids感冒药片是对咳嗽、鼻子、发烧、咽喉症状有显著效果的儿童用感冒药。■即使儿童也易饮用的小颗粒甜味药片，并不含妨碍睡眠的咖啡因等。适合儿童服用。■儿童的急性咳嗽以及发烧、鼻涕等症状都希望可以尽快停止。用Pabron Kids感冒药片采取早期处理后，请注意保暖并充分休息。

## 效能或效果

缓解感冒的各种症状（咽喉疼痛、发烧、咳嗽、痰、鼻涕、鼻塞、打喷嚏、恶寒（发烧引起的发冷）、头痛、关节痛、肌肉痛）

## 用法及用量

请尽量在饭后30分以内，按以下用量并配合水或温开水服用：

11岁~14岁， 1天3次，1次4片

7岁~10岁， 1天3次，1次3片

5岁~6岁， 1天3次，1次2片

未满5岁， 不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

药片的取用方法

·如图所示用指尖用力按下装有药片的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。

·（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

## 成分及分量

4錠中

Tipepidine Hibenstate 16.7mg

Guaifenesin 33.3mg

Chlorpheniramine Maleate 1.6mg

Acetaminophen 200mg

## 添加剂

cellulose,anhydrous silicic acid ,Magnesium aluminometasilicate ,Lactose ,Carboxymethylcellulose calcium ,Hydroxypropylcellulose,Magnesium stearate,Hypromellose,Sugar,Titanium oxide,Ferric oxide ,Carnauba wax ,flavor,Vanillin,Benzyl benzoate

## 使用注意事项

### 禁止事项

本药剂为儿童用药，记载着感冒药中所规定的一般性注意事项（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

下述人群请不要服用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群

●在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）

●服用后不要驾驶交通工具或操作机械类（会出现嗜睡症状）

请不要在服用前后饮酒

●不要长期连续服用

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师或牙科医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

拥有以下症状的人群

高烧

排尿困难

接受以下诊断的人群

心脏病

肝脏病

肾脏病

胃及十二指肠溃疡

青光眼

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：

恶心  
呕吐  
食欲不振  
精神神经系统：  
头晕  
泌尿系统：  
排尿困难  
其他：  
体温过低

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

哮喘：呼吸时出现哮喘音、气闷等情况。

再生障碍性贫血：出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适，难以站稳、血尿等症状。

粒细胞缺乏症：出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

口腔干燥

嗜睡

●若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。

21

### 【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任