

PABRON SUPPOSITORIES for KIDS

- ◆都说儿童的疾病是从发烧开始，所以发烧是最常见的症状。
但是，发烧可能会导致体力的消耗等，因此退烧十分重要。
- ◆PABRON SUPPOSITORIES for KIDS 能够有效缓解儿童急性发烧症状。

效能

儿童发烧时的暂时性退烧

用法及用量

请按以下用量插入肛门内。

6岁~12岁，1天1次，1次1~2粒

3岁~5岁，1天1次，1次1粒

1岁~2岁，1天1次，1次1/2~1粒

未满1岁，不宜使用

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
- 本药剂请勿连续使用2天。
- 本药剂仅限用于肛门，请勿内服。

成分

1粒(1g)中

乙酰氨基酚 100mg

添加剂

氢化植物油

使用注意事项

本药剂为儿童用药，记载着解热药中所规定的一般性注意事项。

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

- 下述人群请不要使用
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。
因使用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群。
- 在使用本药剂期间，不要使用下述任何医药品
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药
- 请不要在使用前后饮酒
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在使用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师或牙科医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
年老体弱的人群。
因药物等出现过过敏症状的人群。
接受以下诊断的人群。
心脏病，肾脏病，肝脏病，胃及十二指肠溃疡
- 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒
消化器官：噁心、呕吐、食欲不振，腹泻，软便，便秘
精神神经系统：头晕
其他：体温过低
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
休克(过敏性)：使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

药物超敏反应综合征：出现皮肤大范围发红、全身性起疹、发烧、身体疲倦、淋巴结（颈部、腋窝、腹股沟等）肿大等症状。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

●如果使用过 1 次后又再次发烧，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的 30°C 以下的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 请将栓剂的前端向下放入外盒内，并按照外盒上的标记竖立保管。
- 请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。