

PABRON SUPPOSITORIES for KIDS

- ◆어린이의 병은 발열부터 시작한다고 해도 될 만큼, 가장 일반적인 증상입니다. 그러나 체력 소모 등을 초래할 우려가 있으므로 열을 내리는 것이 중요합니다.
- ◆PABRON SUPPOSITORIES for KIDS 은 어린이의 갑작스런 발열을 효과적으로 내리는 약입니다.

효능

소아 발열시의 일시적인 해열

용법 및 용량

다음의 양을 항문 안에 주입하십시오.

6 세~12 세, 1 회 1~2 개, 1 일 1 회

3 세~5 세, 1 회 1 개, 1 일 1 회

1 세~2 세, 1 회 1/2~1 개, 1 일 1 회

1 세 미만, 사용하지 말 것

주의

- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하십시오.
- 본제는 2 일 연속 사용하지 마십시오.
- 본제는 항문에만 사용하고, 내복하지 마십시오.

성분

1 개 (1g)중

아세트아미노펜 100mg

첨가물

경질 지방

사용상의 주의

본제는 소아용이지만, 해열제약으로서 정해진 일반적인 주의사항을 기제하고 있습니다.

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽습니다)

- 다음에 해당하는 사람은 사용하지 마십시오
본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
본제 또는 다른 해열 진통제, 감기약을 사용하여 천식을 일으킨 적이 있는 사람.
- 이 약을 사용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 사용하지 마십시오
다른 해열 진통제, 감기약, 진정제
- 사용 전후는 음주하지 마십시오
- 장기간 계속해서 사용하지 마십시오

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.
고령자 및 허약한 사람.
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
다음의 진단을 받은 사람.
심장병, 신장병, 간장병, 위·십이지장 궤양
- 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
피부: 발진·발적, 가려움
소화기: 메스꺼움 및 구토, 식욕부진, 설사, 연변, 변의
정신신경계: 현기증
기타: 과도한 체온 저하
- 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.

쇼크 (아나필락시스): 사용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉼소리, 재채기, 이후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.

피부 점막안 증후군 (스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 응해증, 급성 범발성 발진성 농포증: 고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도돌한 것 (작은 농포) 이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.

약제성 과민증 증후군: 피부가 넓은 범위로 빨개진다, 전신성 발진, 발열, 몸이 나른하다, 림파절 (목, 겨드랑이 밑, 가랑이 등) 의 부음 등이 나타난다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.

신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통 (마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.

간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.

천식: 숨을 쉴 때 색색, 휘휘과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.

● 1 회 사용해도 재차 발열한 경우는 사용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 30°C 이하인 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 좌제의 끝부분을 아래쪽으로 향해 걸상자에 넣고, 상자 표시에 따라 세워서 보관하십시오.
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오. (품질유지를 위하여)

11

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.