

◆坊間流傳幼兒疾病多由發燒開始般，發燒屬於極為普通的症狀。然而，發燒可能造成體力消耗等，因此退烧解熱也相當重要。●兒童百保能栓劑為對於兒童突如其來的發燒發揮效用，有效幫助退烧。

## 療效或效果

兒童發燒時的暫時性退烧

## 用法及用量

請將以下用量插入肛門內：

6歲～12歲，1天1次，1次1～2粒

3歲～5歲，1天1次，1次1粒

1歲～2歲，1天1次，1次1/2～1粒

未滿1歲者，請勿使用

請務必遵守規定用法、用量。

兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。

本藥劑請勿連續使用2天。

本藥劑僅供肛門部位使用，請勿內服。

## 成分及分量

1粒 (1g 中)

Acetaminophen 100mg

## 添加劑

Hard fat

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

本藥劑屬於兒童專用藥物，記載事項為解熱藥所定一般注意事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

符合下列情形者請勿使用。

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥，引發氣喘的人。

●使用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥

●使用前後，請勿飲酒

●請勿長期連續服用

### 諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師或牙科醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

年長者。

虛弱者

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

接受過下列診斷的人。

心臟病

肝臟病

腎臟病

胃潰瘍、十二指腸潰瘍

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

消化器官：

噁心

嘔吐

食欲不振

腹瀉

軟便

便意

精神神經系統：

頭暈

其他：

過度的體溫低下

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克（過敏性）：使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

使用1次後仍再度發燒時，請停止使用，

攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低且溫度30℃以下的陰涼處保管

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

保管之際，請將塞劑前端朝下收入外盒後遵照外盒箭頭指示直立保管

請勿服用超過使用期限的產品。

此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

91

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- ・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- ・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- ・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- ・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。