

PABRON SUPPOSITORIES for KIDS

- ◆兒童的疾病通常由發燒開始，這是最常見的症狀。
然而，發燒可能造成體力消耗等情況，因此退燒相形重要。
- ◆PABRON SUPPOSITORIES for KIDS 是有效緩解兒童急性發燒症狀的藥劑。

療效

兒童發燒時的暫時性退燒

用法及用量

請將以下用量插入肛門內。

6 歲~12 歲，1 天 1 次，1 次 1~2 粒

3 歲~5 歲，1 天 1 次，1 次 1 粒

1 歲~2 歲，1 天 1 次，1 次 1/2~1 粒

未滿 1 歲者，請勿使用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 使用於兒童的情況下，請在家長的指導監督下使用。
- 本藥劑請勿連續使用 2 天。
- 本藥劑僅供肛門部位使用，請勿內服。

成分

1 粒 (1g) 中

乙醯胺酚 100mg

添加劑

氫化植物油

使用上的注意事項

本藥劑屬於兒童專用藥物，記載事項為解熱藥所定一般注意事項。

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 符合下列情形者請勿使用
 - 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
 - 曾因使用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥，引發氣喘的人。
- 使用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品
 - 其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥
- 使用前後請勿飲酒
- 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
 - 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
 - 孕婦或可能懷孕的人。
 - 高齡者及體虛者。
 - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
 - 接受過下列診斷的人。
 - 心臟病、腎臟病、肝臟病，胃潰瘍、十二指腸潰瘍
- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
 - 皮膚：發疹、發紅，發癢
 - 消化系統：惡心、嘔吐、食欲不振，腹瀉，軟便，便秘
 - 精神神經系統：頭暈
 - 其他：過度的體溫低下
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
 - 休克（過敏性）：使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。

藥物過敏症候群：皮膚廣泛性發紅，出現全身發疹、發燒、倦怠感、淋巴結（頸部、腋下、腹股溝等）腫大等。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

●如使用 1 次後再有發燒情況，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- ・請置於避免日光直射、濕度較低且溫度 30°C 以下的陰涼處保管。
- ・請置於兒童無法觸及之處保管。
- ・請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- ・將栓劑前端朝下收入外盒內，並遵照外盒箭頭指示直立保管。
- ・請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- ・本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- ・多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- ・多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- ・供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。