

PRESER ACE INSERTING-TYPE OINTMENT T

- ◆ Preser Ace 插入软膏 T 软膏中的缓解痛感的 lidocaine、抑制出血的 tetrahydrozoline hydrochloride、缓解炎症的 hydrocortisone acetate 等作用于有严重痛感、急性出血的痔疮上，发挥显著的效果。
- ◆ 在肛门内侧（肛门里面）的痔疮中插入使用，在肛门外侧的痔疮中涂抹使用，可以选择 2 种使用方法。无需用手直接接触患处以及药剂，可以干净地插入使用。
- ◆ 使用感清爽而舒适。

效能

〔插入时〕缓解肛裂、痔核疼痛、出血、肿胀、发痒

〔涂抹时〕缓解肛裂、痔核疼痛、出血、肿胀、发痒以及消毒

用法及用量

〔注入时〕

请将容器前端插入肛门内，将药物全部注入。

15 岁以上，1 次 1 粒，1 天 1~3 次

未满 15 岁，不宜使用

- 取下盖子，挤出少量软膏使滑动顺畅。
- 将容器端部插入到肛门内，再按下容器挤入药剂。（请保持按压的状态拔出）

〔涂抹时〕

请按以下用量涂抹于肛门处。曾涂抹过一次的药剂请勿再用于注入。

15 岁以上，适量，1 天 1~3 次

未满 15 岁，不宜使用

- 取下盖子，直接涂抹软膏或涂抹在纱布等后敷在患处。
 - ※软膏发硬难以挤出时，用手握暖就会变软。
 - ※由于是插入式，容器内部会残留少量药剂，填充时将此残留量估计在内。

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 请不要让儿童使用。
- 仅限用于肛门处。
- 插入肛门内部时，只插入容器的前端部分。

成分

1 粒 (2g) 中

醋酸氢化可的松 5mg

盐酸四氢唑林 1mg

利多卡因 60mg

l-薄荷醇 10mg

尿囊素 20mg

生育酚乙酸酯 60mg

盐酸洗必泰 5mg

添加剂

液体石蜡，肉豆蔻酸异丙酯，白蜂蜡，卡波普，橄榄油，凡士林

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 下述人群请不要使用。
 - 因本药剂或本药剂成分 chlorhexidine 引起过过敏症状的人群
 - 患处化脓的人群。
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 - 正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

- 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒，红肿
其他：刺激感，化脓
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
休克（过敏性）：使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
- 即使使用 10 日左右仍不见症状好转时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
- 请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）
- 请勿将使用后的容器等，冲进厕所里

31

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。