

PRESER ACE INSERTING-TYPE OINTMENT T

- ◆ Preser Ace T 注入軟膏針對難受疼痛、急遽出血的痔瘡，以抑制疼痛的 lidocaine、抑制出血的 tetrahydrozoline hydrochloride、消炎作用的 hydrocortisone acetate 等複合成分有效作用，發揮優異效果。
- ◆ 對肛門內側（肛門深處）痔瘡以注入方式；對肛門外側痔瘡則以塗抹方式，2 種用法可自選。無須直接以手觸摸患部及藥劑即可注入，潔淨衛生。
- ◆ 清涼舒爽的使用感。

療效

- [注入時] 舒緩肛裂、疣痔的疼痛、出血、腫脹、搔癢
[塗抹時] 肛裂、疣痔的疼痛、出血、腫脹、搔癢的舒緩及消毒

用法及用量

[注入時]

請將容器頭端部份插入肛門，然後注入全部用量。

15 歲以上，1 次 1 粒，1 天 1~3 次

未滿 15 歲者，請勿使用

- 取下上蓋，稍稍擠出軟膏以使其易於潤滑。
- 將容器前端插入肛門，按壓容器將藥劑注入。（請於按壓容器的狀態下拔除）

[塗抹時]

請將以下用量塗抹於肛門位置。另外，曾用於塗藥的藥劑，注入時請勿使用。

15 歲以上，適量，1 天 1~3 次

未滿 15 歲者，請勿使用

- 取下蓋子，將軟膏直接塗抹或塗抹在紗布等後敷在患部。
 - * 軟膏變硬而難以釋出時，請以手握持加溫即可使藥劑軟化。
 - * 為注入式劑型，因此容器中可能殘留些許藥劑。由於填充藥劑時已將剩餘藥量納入評估，因而效果並不受影響。

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童不得使用。
- 請只使用於肛門部位。
- 注入肛門使用時，請僅將容器前端部分插入並注入藥劑。

成分

1 粒 (2g) 中

醋酸氫化可體松 5mg

鹽酸四氫唑啉 1mg

利多卡因 60mg

l-薄荷腦 10mg

尿囊素 20mg

生育醇醋酸酯 60mg

鹽酸氯己西汀 5mg

添加劑

液體石蠟，肉豆蔻酸異丙酯，白蜂蠟，卡波姆，橄欖油，凡士林

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 符合下列情形者請勿使用。
 - 曾因本藥劑或本藥劑成分 chlorhexidine 引發過敏症狀者。
 - 患部正在化膿的人。
- 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：發疹、發紅，發癢，腫脹
其他：刺激感，化膿
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
休克（過敏性）：使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
- 使用 10 天左右症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）
- 使用完畢的容器等請勿投入馬桶後沖走

31

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。