

PRESER ACE SUPPOSITORIES T

- ◆PRESER ACE SUPPOSITORIES T 針對難受疼痛、急遽出血的痔瘡，以抑制疼痛的 lidocaine、抑制出血的 tetrahydrozoline hydrochloride、消炎作用的 hydrocortisone acetate 等複合成分有效作用，發揮優異效果。
- ◆清涼舒爽的使用感。

療效

舒緩肛裂、疣痔的疼痛、出血、腫脹、搔癢

用法及用量

請將以下用量插入肛門內。

15 歲以上，1 次 1 粒，1 天 1~3 次

未滿 15 歲者，請勿使用

★請於入浴後或以溫水清潔患部後再行使用。早晨排便後或夜間入睡睡前使用將使效果更佳。

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 如本藥劑過軟時，請將其暫時冷卻後再行使用。此外，藥劑過硬時則將其放軟後再行使用。
- 僅供肛門部位使用。

成分

1 粒 (1.65g) 中

醋酸氫化可體松 5mg

鹽酸四氫唑啉 1mg

利多卡因 60mg

l-薄荷腦 10mg

尿囊素 20mg

生育醇醋酸酯 60mg

鹽酸氯己西汀 5mg

添加劑

卡波姆，二氧化矽，單硬脂酸甘油酯，氫化植物油

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 符合下列情形者請勿使用
曾因本藥劑或本藥劑成分 chlorhexidine 引發過敏症狀者。
患部正在化膿的人。
- 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：發疹、發紅，發癢，腫脹
其他：刺激感，化膿
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
休克（過敏性）：使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
- 使用 10 天左右症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低且溫度 30°C 以下的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。

- 保管之際，請將栓劑前端朝下收入外盒並遵照外盒箭頭指示將其直立保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。(為確保品質)

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。