

PRESER ACE OINTMENT

指定第二類醫藥品
痔疾用外用藥

◆ Preser Ace軟膏針對難受疼痛、急遽出血的痔瘡，以抑制疼痛的lidocaine、抑制出血的tetrahydrozoline hydrochloride、消炎作用的hydrocortisone acetate等複合成分有效作用，發揮優異效果。●清涼舒爽的使用感。

療效或效果

〔塗抹時〕肛裂、疣痔的疼痛、出血、腫脹、搔癢的舒緩及消毒

用法及用量

請取適量，1天1~3次，塗抹於肛門位置。

請於入浴後或以溫水清潔患部後再行使用。早晨排便後或夜間入睡睡前使用將使效果更佳

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

本藥劑僅供肛門部位使用。

成分及分量

100g中

Hydrocortisone acetate 0.5g

Tetrahydrozoline hydrochloride 0.05g

Lidocaine 3g

Chlorpheniramine Maleate 0.2g

l-Menthol 0.2g

Allantoin 1g

Tocopherol Acetate 3g

Chlorhexidine Hydrochloride 0.25g

添加劑

BHT,Dimethylpolysiloxane ,Carboxyvinyl polymer,Palmitic acid dextrin,synthesis Squalane,Medium-chain fatty acid triglyceride,Petrolatum

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

●下列的人請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑成分chlorhexidine引發過敏症狀者。

患部正在化膿的人。

●請勿長期連續服用

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

腫脹

其他：

刺激感

化膿

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克（過敏性）：使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

使用10天左右症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿使用超過使用期限的產品。

此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。