

복용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

반복되는 치핵, 치질의 출혈·통증에



판매명: PRESER G CAPSULES

제2류 의약품(일반의약품)

<치질용 내복약>

- ◆ PRESER G CAPSULES은 수치질과 치질의 출혈·통증·부종이 나타났을 때 마시는 치질약으로 신체 내에서 작용합니다.
- ◆ 식물에서 유래한 유효 성분 멜릴로트 추출물은 수치질의 원인인 치핵의 울혈을 안쪽에서 개선하여 치핵을 뿌리부터 작게 만듭니다.
- ◆ 1회 1캡슐, 1일 3회 복용하면 반복되는 수치질과 치질의 출혈·통증·부종에 효과가 뛰어납니다.



사용 시 주의사항



상담

1 다음과 같은 사람은 복용하기 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 임신 또는 임신 중이라고 생각되는 사람.
- (3) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

2 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
소화기	식욕 부진, 메스꺼움·구토

3 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해질 경우에는 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

설사

4 1개월 정도 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

효능

다음과 같은 증상의 완화: 치핵(수치질), 치질 출혈, 치질 통증, 치질 부종

용법·용량

다음 용량을 물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회 용량	복용 횟수
성인(15세 이상)	캡슐 1개 	1일3회
15세 미만	복용하지 마십시오	

[주의]

- (1) 정해진 용법·용량을 엄격하게 준수하십시오. <캡슐을 꺼내는 그림>
- (2) 캡슐을 꺼내는 방법
그림과 같이 캡슐이 들어 있는 PTP시트의 돌출부를 손가락 끝으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일을 찢고 제거한 후 복용하십시오. (실수로 그대로 삼키면 식도 점막이 찢리는 등 예상치 못한 사고로 이어질 수 있습니다.)



성분

1캡슐 중

성분	분량	효능
멜릴로트 추출물	50mg	수치질의 원인인 치핵의 울혈을 안쪽에서 개선하여 수치질을 완화시킵니다.

첨가물: 폴리옥시에틸렌 경화피마자유 60, 모노스테아린산 글리세린, 중쇄지방산 트리글리세라이드, 호박산 젤라틴, 농글리세린, 흑산화철, 대두 레시틴

보관 및 취급 시 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 습하지 않은 곳에 보관하십시오. (고온·다습한 환경에 두면 캡슐이 말랑해질 수 있음)
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 내복용으로만 사용하십시오.
- (4) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 달라질 수 있음)
- (5) 캡슐을 열어 내용물을 꺼내지 마십시오.
- (6) 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오. 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 복용하십시오. (품질 유지를 위해)



[다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항]

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.