

PRESER S SUPPOSITORIES T

- ◆PRESER S SUPPOSITORIES T 含有缓解炎症的 hydrocortisone acetate 等对于痔疮治疗有效的成分。这些成分发挥作用，缓解痛感、出血、肿胀、发痒等痔疮症状。
- ◆栓剂小型化后，使用更方便了。

效能

缓解肛裂、痔核疼痛、出血、肿胀、发痒

用法及用量

请按以下用量插入肛门内：

成年人（15 岁以上）：1 次 1 个，1 天 1~3 次

未满 15 岁，不宜使用

★在使用之前洗澡或用温水清洗患处，早上在排便后、晚上在入睡前使用的话，效果会更好。

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 本药剂过软时，请冷却一段时间后使用。另外，如果在寒冷时期或因低温储存造成栓剂表面过硬时，请用手（或手指）进行加温使表面变得光滑后再使用。
- 仅限用于肛门。

成分

1 粒（1.00g）中

醋酸氢化可的松 5mg

利多卡因 50mg

l-薄荷醇 9mg

尿囊素 10mg

生育酚乙酸酯 50mg

添加剂

卡波普，二氧化硅，氢化植物油

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 下述人群请不要使用。
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群
患处化脓的人群。
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
孕妇或有其可能性的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
- 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒，红肿
其他：刺激感，化脓
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
休克（过敏性）：使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
- 即使使用 10 日左右仍不见症状好转时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的 30°C 以下的阴凉场所
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 保管时，请将栓剂的前端向下放入外盒内，并遵照外盒上的标记直立保管

- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)
- 请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。(为了保证质量)

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。