

# PRESER S SUPPOSITORIES T

- ◆PRESER S SUPPOSITORIES T 含具消炎作用的 hydrocortisone acetate 等治療痔瘡有效成分的配方。前述成分發揮作用，舒緩痔瘡的疼痛、出血、腫脹、搔癢症狀。
- ◆栓劑小型化後，使用更為方便。

## 療效

舒緩肛裂、疣痔的疼痛、出血、腫脹、搔癢

## 用法及用量

請將以下用量插入肛門內：

成人(15 歲以上)，1 次 1 個，1 天 1~3 次

未滿 15 歲者，請勿使用

★請於入浴後或以溫水清潔患部後再行使用。早晨排便後或夜間入睡睡前使用將使效果更佳

### 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 如本藥劑過軟時，請將其暫時冷卻後再行使用。如果栓劑表面因寒冷時期或低溫儲存而變得過於堅硬，請以雙手（手指）溫熱使表面光滑後再行使用。
- 僅供肛門部位使用。

## 成分

1 粒 (1.00g) 中

醋酸氫化可體松 5mg

利多卡因 50mg

l-薄荷腦 9mg

尿囊素 10mg

生育醇醋酸酯 50mg

### 添加劑

卡波姆，二氧化矽，氫化植物油

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 符合下列情形者請勿使用。
  - 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
  - 患部正在化膿的人。

- 請勿長期連續服用

### 諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - 正在接受醫師治療的人。
  - 孕婦或可能懷孕的人。
  - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - 皮膚：發疹、發紅，發癢，腫脹
  - 其他：刺激感，化膿
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
  - 休克（過敏性）：使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
- 使用 10 天左右症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低且溫度 30°C 以下的陰涼處保管
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 保管之際，請將塞劑前端朝下收入外盒並遵照外盒箭頭指示將其直立保管

- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿使用超過使用期限的產品。此外, 即使於使用期限內, 產品一經開封, 請儘早使用完畢。(為確保品質)

**【提供多語言產品資訊時的免責聲明】**

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下, 獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯, 僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯, 如有改動或更改, 恕不另行通知。
- 供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。