

PRESER S CREAM

- ◆PRESER S CREAM 含有缓解炎症的 hydrocortisone acetate 等对于痔疮治疗有效的成分。这些成分发挥作用，缓解痛感、出血、肿胀、发痒等痔疮症状。
- ◆使用感清爽而舒适。

效能

缓解肛裂、痔核疼痛、出血、肿胀、发痒以及消毒

用法及用量

1天 1~3次，请取适量涂抹于肛门处。

★请在使用之前洗澡或用温水清洗患处后使用。另外，早上在排便后、晚上在入睡前使用的话，效果会更好。

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
- 仅限用于肛门处。

软管的开孔方法

- 把软管的盖子反过来，将突起的部分用力推到管尖上。

成分

100g 中

醋酸氢化可的松 0.3g

盐酸利多卡因 3g

l-薄荷醇 0.1g

生育酚乙酸酯 1g

氯化十六烷基吡啶 0.2g

添加剂

硬脂醇，鲸蜡醇，1,3-丁二醇，中碳链脂肪酸甘油三酯，山梨醇酐硬脂酸酯，自乳化单硬脂酸甘油酯，聚山梨酯 60，BHT，二甲基聚硅氧烷，柠檬酸，柠檬酸钠，乙二胺四乙酸钠

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

- 下述人群请不要使用。
患处化脓的人群。
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
孕妇或有其可能性的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
- 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒，红肿
其他：刺激感，化脓
- 即使使用 10 日左右仍不见症状好转时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)
- 请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。(为了保证质量)

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。