

# PRESER S CREAM

- ◆PRESER S CREAM 含具消炎作用的 hydrocortisone acetate 等治療痔瘡有效成分的配方。前述成分發揮作用，舒緩痔瘡的疼痛、出血、腫脹、搔癢症狀。
- ◆清涼舒爽的使用感。

## 療效

肛裂、疣痔的疼痛、出血、腫脹、搔癢的舒緩及消毒

## 用法及用量

請取適量，1天1~3次，塗抹於肛門位置。

★請於入浴後或以溫水清潔患部後再行使用。於晨間排便後或夜間入睡睡前使用將使效果更佳。

### 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 使用於兒童的情況下，請在家長的指導監督下使用。
- 請只使用於肛門部位。

### 如何在軟管上開孔

- 將瓶蓋反轉過來後將突起部位用力按壓於管嘴之上。

## 成分

100g 中

醋酸氫化可體松 0.3g

鹽酸利度卡因 3g

l-薄荷腦 0.1g

生育醇醋酸酯 1g

十六烷基氯化吡啶 0.2g

### 添加劑

硬脂醇，鯨蠟醇，1,3-丁二醇，中鏈三酸甘油酯，山梨醇酐單硬脂酸酯，自乳化型單硬脂酸甘油酯，聚山梨醇酯 60，BHT，二甲基聚矽氧烷，檸檬酸，檸檬酸鈉，乙二胺四乙酸二鈉

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 符合下列情形者請勿使用。

患部正在化膿的人。

- 請勿長期連續服用

### 諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：發疹、發紅，發癢，腫脹

其他：刺激感，化膿

- 使用 10 天左右症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

- 請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。(為確保品質)

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。