

RiUP Regenne

RiUP Regenne 為對於女性早年禿髮的效用、效果獲得認證的「藥品」。添加針對女性頭皮作用的有效成分 minoxidil 以及調整頭皮環境的成分配方。

效用及效果

用於早年禿髮的生髮、育髮及預防持續禿髮（掉髮）。

用法及用量

成年女性（20 歲以上），每日 2 次，每次 1mL，塗抹於禿髮的頭皮之上。

無論禿髮範圍大小，請遵守每次 1mL 的使用量。以 1mL 用量延展即可充分塗抹於全頭皮的藥量設計。

此外，容器為可取用 1mL 的款式。

注意事項

- 即使以超出規定用法、用量的範圍使用或頻繁使用效果並不變。請務必遵守規定用法、用量。（即使超出規定用量使用，不僅效果不變，更將造成副作用產生的可能性增加。）
- 請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情況下，請接受眼科醫師的診療。
- 如沾附藥劑的雙手接觸眼睛等黏膜部位將造成刺激，因此請將沾附於雙手的藥劑徹底洗淨。
- 頭髮較長者，請將頭髮撥開，將藥劑仔細塗抹於頭皮，避免沾染頭髮。
- 請避免與可能受酒精成分溶解之物（眼鏡框、化學纖維等）接觸。
- 造型劑及美髮造型噴霧請於使用本藥劑後使用。
- 使用染髮劑（造型染髮、染髮、染白髮等）時，請於染髮流程完全結束後再行使用。
- 使用接髮或部分假髮者，請於本藥劑充分乾燥後再行配戴。

成分及分量

100mL 中

敏諾西代 1.0g

泛醇乙醚 1.0g

生育醇醋酸酯 0.08g

l-薄荷腦 0.3g

添加劑

1,3-丁二醇，檸檬酸，乙醇，透明質酸鈉

使用上的注意事項

禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用。

●符合下列情形者請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

未成年人（未滿 20 歲）。

於日本國內未有使用經驗。

懷孕或可能懷孕以及哺乳中的婦女。

懷孕期間使用本藥劑的安全性尚未獲得充分驗證。此外，minoxidil 成分會轉移到乳汁內。

因懷孕或生產而引起禿髮者。

屬於非早年禿髮的禿髮症可能性較高時。

因停止服用口服避孕藥而引起禿髮者。

屬於非早年禿髮的禿髮症可能性較高時。

早年禿髮以外的禿髮症者（例如：甲狀腺疾病、過度節食、斑禿等）或原因不明的禿髮症者。

本藥劑僅對早年禿髮有效。

不僅是頭頂部位，頭部全體包括頭側及後枕部位均有禿髮者。

與男性相較，女性禿髮問題常為甲狀腺疾病所造成等，可能屬於早年禿髮以外的禿髮症或其他因素所造成的禿髮。

急速禿髮，頭髮呈斑狀脫落者。

屬於非早年禿髮的禿髮症可能性較高時。

因強烈拉扯頭皮的髮型而導致禿髮者。

屬於非早年禿髮的禿髮症可能性較高時。

男性。

男性請使用 RiUP 系列男性專用產品。

●請勿用於下列部位

本藥劑僅供頭皮使用，請勿內服。

可能造成血壓下降等。

出現傷口、濕疹或發炎症狀（發紅）等的頭皮。

可能造成傷口惡化。

- 使用本藥劑時，請避免於頭皮使用其他生髮劑或外用藥（軟膏、液劑等）。另外，如使用以上藥劑時，請停止使用本藥劑。
該藥劑可能影響本藥劑的吸收效果。

諮詢事項

- 符合下列情形者請在使用前諮詢醫師或藥劑師

曾因藥物或化妝品等引發過敏症狀者（例如：出疹、發紅、搔癢、斑疹等）。

高血壓者、低血壓者。

本藥劑可能對血壓造成影響。

罹患心臟或腎臟疾病者。

本藥劑可能對心臟及腎臟造成影響。

浮腫者。

可能造成浮腫症狀加重。

家族及兄弟姐妹中並無早年禿髮者。

造成早年禿髮的主因可能為遺傳。

老年人（65 歲以上）。

一般而言老年人容易出現不適症狀。

受診斷為患有下列疾病者。

甲狀腺機能障礙（甲狀腺機能低下症、甲狀腺機能亢進症）。

可能因甲狀腺疾病而造成禿髮。

- 使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師

皮膚：頭皮出疹、發紅*、搔癢、斑疹、頭皮屑、使用部位的灼熱感等

*：可能出現於頭皮以外的部位。

精神神經系統：頭痛、意識模糊、暈眩

循環器官：胸痛、心跳速度加快

代謝系統：原因不明的體重急速增加、四肢浮腫

- 使用 6 個月後，下列任一症狀未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師

禿髮狀態程度、生髮或細軟髮生長、粗硬髮生長、掉髮程度。（粗硬髮之外，細軟短髮的掉髮亦有所減少即可視為獲得改善。）

與男性相較，女性禿髮問題常為甲狀腺疾病所造成等，可能屬於早年禿髮以外的禿髮症或其他因素所造成的禿髮。

- 即使於開始使用後的 6 個月內，如禿髮狀態惡化或發生下列禿髮現象時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師

不僅是頭頂部位，頭部全體包括頭側及後枕部位均有禿髮者、頭髮以外的掉毛、毛髮呈斑狀脫落者、急速毛髮脫落等。

與男性相較，女性禿髮問題常為甲狀腺疾病所造成等，可能屬於早年禿髮以外的禿髮症或其他因素所造成的禿髮。

其他注意事項

- 毛髮生長需要一段時間。感受效果最短需要 6 個月，因此請每日持續使用。

本藥劑有效性為使用 6 個月之後出現。

- 毛髮生長程度因人而異，本藥劑並非對所有使用者皆有效。

- 為了維持效果，必須持續使用，如停止使用可能逐漸恢復原本狀態。

本藥劑並非解決早年禿髮原因的藥物。

保管及使用上的注意事項

- 使用後，請旋緊瓶蓋，避免日光直射、高溫、寒冷之處，置於陰涼處保管。

- 請置於兒童無法觸及之處保管。

- 為避免誤用並確保品質，請勿換裝於其他容器。

- 請遠離火源。

- 請勿使用超過使用期限的產品。

21

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。